

ΣΗΛΥΒΡΙΑ

τ. Περ. Νο. 2. 106. 107. uai 109.

Années 1849 uai 1855. Tableaux officiels.

Éyalet E'dirni.

Nombre des Livars 6.

Designation des Livars.

a. Névahi Erban Nombre des Kazar 4.

b. Tekfour Daghi . . . . . 10

c. Gueliboli . . . . . 9.

d. E'dirni . . . . . 11

e. Filiki . . . . . 8

f. Islinié . . . . . 8.

Tabel des Kazar - 50.

Nomenclature officielle des Livars et des Kazar, pour l'année 1855.

a. Lira de "Névahi Erban" (Névahi Arboé ou des Quatre Districts)

Subdivisé en 4 Kazar

1. Tchataldja.

2. Buyuk Tchekmedje

3. Kutcluk Tchekmedje

4. Terkor (Derkos) et

5. Kourai (village de) Souioulou. (Ne figure pas dans la classification de 1849)

(2) Névahi est le pluriel de Nahié.)

b. Lira de "Tekfour Daghi" et de "Vizé" (Viza).

Subdivisé en 10 Kazar.

Tekfour Daghi, autrement nommé Rodostchik.

Inedjik (Ainedjik)

Midia

Vizé

Lulé Bergoci (Lulé Bourgar)

District d'Érepli

Tchorlou


Sarai-Vizé (C'est-à-dire Sarai près de Vizé.)

Silinié

Khiriéboli (Aizobol).

A. Viquesnel:

Voyage dans la  
Turquie d'Europe  
Description Physique  
et Géologique de  
la Thrace.  
Paris 1868



n. 158.

Emplois ou Officiers Judiciaires.

La Turquie est divisée, sous le rapport de l'administration de la justice:

En 21 Mévléviets, ou Grand Ressorts Judiciaires, correspondant à nos Cours d'Appel. Et renfermant un certain nombre de "Kaza" ou tribunaux ordinaires.

Le nom "Kaza" a deux significations dans la division administrative. Le Kaza est un chef-lieu de district.

Dans la division judiciaire, le Kaza est un tribunal ordinaire.

Extrait de l'"Annuaire de l'Empire Ottoman" année 1847  
Mévléviets d'Andrinople comprenant 5 Kaza:

Andrinople

Silivri

Viza

Gallipoli

Rodosto.

n. 150.

Second Tchiflik de Turkuenli et embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto (1849). Eni rû ôdôu Hyantwar-Troopdâ.

n. 151.

Embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto, près de Kaza Oglou Tchiflik. Eni rû ôdôu Troopdâ (le village du même nom se trouve à 20 minutes plus loin à droite) (1849). Eni rû ôdôu Troopdâ - Paidepou.

n. 291-292

De Sarai à Büyük Han.

Büyük Han (altitude, 240 mètres), auberge isolée, située au sommet du plateau dans une petite dépression charant d'arriver au versant qui jette ses eaux dans la Mer de Marmara. Tous ces plateaux sont couverts de taillis de chênes, auxquels on donne une partie de poutres.

De Büyük Han à Silivri.

Suivre le sommet du plateau jusqu'à Beydjiler.

A partir de ce hameau, descendre par un ravin servant de lit à un ruisseau jusqu'à Kuchtdemir.

De là, traverser plusieurs ruisseaux et arriver à Silivri, sur le bord de la mer.

(2uo d'oubti)

Le plateau de Büyük Han peut avoir 200 mètres.  
 Celui de Kuchtdemir 100 mètres au-dessus de la mer.  
 Quelques broussailles et brins de gazon couvrent le plateau supérieur;  
 plus bas, gazon ou cultures près des villages.

n. 294. D'Orzanti au sommet du Mont Kouckkaia.  
 Le double pic du Kouckkaia est située à l'extrémité d'un coude-fort  
 qui se rattache au Karatépé, et donc la barre est baignée par les eaux qui  
 tombent dans le lac et viennent déboucher en face d' Eledjik Man-  
 drari, à 2 heures d'Orzanti.

La séparation des eaux, qui tombent d'un côté dans le lac et de l'autre dans  
 le ruisseau Erghéni, est à 3 heures de distance à cause des contours de  
 la route, des montées et des descentes: il faudrait réduire probable-  
 ment de moitié cette distance.

De cette séparation à Büyük Han il y a 2 heures.

Le Kouckkaia paraît être plus élevé que la séparation. Entre elle et la  
 station il existe un ou deux coude-forts indiquant l'existence de vallées  
 et dont les eaux viennent tomber dans le lac. La hauteur à peu près  
 égale de ces accidents du sol donne à cette contrée montagneuse l'  
 apparence d'un plateau. Bois et gazon.

Silivri est à peu près dans la direction du S. 20° O.

n. 310

En descendant à Silivri, à côté du point où l'on trouve, à 5 minutes  
 avant d'arriver au village, des rognons aplatis, cimentés à un grès très-  
 dur, et formant des cordons dans les sables.

Ils renferment des empreintes charbonneuses de plantes.

Au-dessus reposent des couches de grès molasse renfermant des bival-  
 ves et des univalves très-bien conservés, notamment des congé-  
 riers dont les deux valves sont réunies.

n. 311

Couches de grès, si riches en congérier, de Silivri.

n. 433.

Les grès à "Mytilus" de Silivri s'étendent jusqu'aux environs de  
 Büyük. Tchekmedjé.

Ils sont quelquefois très-grossiers et passent au conglomérat.

(Anodonta.)

Ces rochers arénacés paraissent à des grès plus fins, contenant des parties tuberculeuses, souvent considérables, qui par l'altération des parties plus tendres offrent à la surface du tal de gros canelons.

Ces conches renferment aussi des coquilles univalves, et dans ce cas elles sont ordinairement tendres et à l'état de grès argileux.

Ce système de conches nous paraît représenter le calcaire à "Mytilus" de Kirk-Kilissé, Viza, Sarai, etc.

Un fait que nous ne pouvons expliquer, c'est l'extrême abondance du calcaire à polypiers et à nummulites dans les constructions de Kuchbeniz, de Silivri et de toutes les fontaines et ponts qu'on rencontre sur la route. De plus, des fragments de même nature touchant la route de distance en distance, d'où proviennent ces matériaux? viennent-ils de loin? existent-ils dans le voisinage, sous les conches à "Mytilus"? Personne n'a pu répondre à cette question.

n. 480.

Paléontologie.

Faune Tertiaire Moyenne, supérieure et plus récente.

No. 708 et 43. Congeria, inédit.

Moules de "Congeria" dans un calcaire gris celluleux. Ils sont plus fortement carénés que ceux de Crinée, et quoique se rapprochent du "C. Balatonica" (Partsch), plus que tout autre, ces moules paraissent en différer par leurs crochets plus proéminents et plus avancés, par le côté antérieur moins excavé, par l'expansion postérieure plus basse, la ligne cardinale étant plus oblique, la coquille plus gibbeuse aussi, comme nous l'avons fait remarquer pour les "Congeria" du no. 793. En comparant ces fossiles au "C. sub-globosa" (Partsch.) on reconnaît qu'ils sont beaucoup plus étroits, que la carène est plus détachée et que leur taille est beaucoup moindre.

Le no. 43 provient d'un grès grossier ou sable trappe de Silivri.

r. I. n. 106. 107. 109.

Années 1849 au 1855. Tableaux officiels.

— Eyalat Edirné. Nombre des Livars 6, Total des Kazar 50.

a. Nérahî Erban. Nombre des Kazar 4

b. Tekfoum Daghi 10.

c. Gheliboli. a. Edirné. e. Filibé. f. Islimid

Lira de "Nérahî Erban" (Nérahî Azbâ ou des Quatre Districts. Nérahî est le pluriel de Nahîl).

Subdivisé en 4 Kazar.

1. Tchataldja

2. Buyuk Tchekmedjé.

3. Kutchuk Tchekmedjé.

4. Terkor (Derkos) et

5. Kourai (village de Souïoulou. (Ne figure pas dans la classification de 1849).

Lira de "Tekfoum Daghi" et de "Vizé" (Viza).

Subdivisé en 10 Kazar.

1. Tekfoum Daghi, autrement nommé Rodostchik.

2. Inedjik (Ainedjik)

3. Midda.

4. Vizé.

5. Lulé Bergoci (Lulé Bouyar).

6. Distrikt d'Erégli.

7. Tchorlou

8. Sarai-Vizé (c'est à-dire Sarai près de Vizé.)

9. Silivzé

10. Khizébolî (Aizabol).

A. Viquesnel:

Voyage dans la  
Turquie d'Europe

Description Physique  
et Géologique de  
la Thrace  
Paris 1868

2  
n. 158

Emploi au Officier Judiciaire. La Turquie est divisée, sous le rapport de l'administration de la justice en 21 Méhériets, ou Grand Ressorts Judiciaires, correspondant à nos Cours d'Appel.

Renfermant un certain nombre de "Kaza" ou tribunaux ordinaires.

Le nom "Kaza" a deux significations dans la division administrative. Le Kaza est un chef-lieu de district.

Dans l'indivision judiciaire le Kaza est un tribunal ordinaire.

Extrait de l'Annuaire de l'Empire Ottoman année 1847.

Méhériet d'Andrinople, comprenant 5 Kaza.

Andrinople

Silivri

Viza

Gallipoli

Rodosto.

n. 150

Second Tchiflik de Turkmenli et embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto (1849). Επιρτή δόσ Τροφού.

n. 151.

Embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto, près de Kaza Oylou Tchiflik (le village du même nom reste à 20 minutes plus loin à droite) 1849. Επιρτή δόσ Τροφού - Πα. δ. δ. δ.

n. 310

En descendant à Silivri, à πέντε μίλια ενωπιον του Εμβασίου, on trouve, à 5 minutes avant d'arriver au village, des rognons aplatis, cimentés à un grès très-dur, et formant des couches dans les sables.

Ils renferment des empreintes charbonneuses de plantes.

Au-dessus reposent des couches de grès molasse renfermant des bivalves et des univalves très-bien conservés, notamment des congéries dont les deux valves sont réunies.

n. 311

Couche de grès, si riches en congéries, de Silivri

n. 433

Les grès à "Mytilus" de Silivri s'étendent jusqu'aux environs de Bujuk Tcheknedje. Ils sont quelquefois très-grogniers et passent au conglomérat.

(à noter)

.. Ces roches arénacées passent à des grès plus fins, contenant des parties tuberculeuses, souvent considérables, qui par l'altération des parties plus tendres offrent à la surface du sol de gros mamelons. Ces conches renferment aussi des coquilles univalves, et dans ce cas elles sont ordinairement tendres et à l'état de grès argileux. Ce système de conches nous paraît représenter le calcaire à *Mytilus* "Mytilus" de Kirk-Kilissé, Viza, Sarai, etc.

Un fait que nous ne pouvons expliquer, c'est l'extrême abondance du calcaire à polypiers et à nummulites dans les constructions de Kuchbeniz, de Silivri et de toutes les fontaines et ponts qu'on rencontre sur la route. De plus, des fragments de même nature jonchant la route de distance en distance: d'où proviennent ces matériaux? viennent-ils de loin? existent-ils dans le voisinage sous les conches à "Mytilus"? Personne n'a pu répondre à cette question.

o. 480.

Paléontologie.

Faune Tertiaire Moyenne, supérieure et plus récente.

No. 708 et 43

*Congeria*, indéterminé.

Moules de "Congeria" dans un calcaire gris celluleux. Ils sont plus fortement carénés que ceux de Grinde, et quoique se rapprochent du "C. Balatonica" (Partsch), plus que tout autre, ces moules paraissent en différer par leurs crochets plus proéminents et plus avancés, par le côté antérieur moins excavé, par l'expansion postérieure plus basse, la ligne cardinale étant plus oblique, la coquille plus gibbeuse aussi, comme nous l'avons fait remarquer pour les "Congeria" du no. 793. En comparant ces fossiles au "C. sub-globosa" (Partsch.) on reconnaît qu'ils sont beaucoup plus étroits, que la carène est plus détachée et que leur taille est beaucoup moindre.

Le no. 43 provient d'un grès grossier ou sable trappéen de Silivri.

