

ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ	Ύδροξειδίου του καλίου	Ύπεροχλωριούχος σίδηρος	Ἀναγωγικὴ μέθοδος Shibata
<i>Reseda alba</i>	—	—	—
<i>Senecio vulgaris</i>	—	—	—
<i>Sisymbrium irio</i>	—	—	—
<i>Sisymbrium officinale</i>	—	—	—
<i>Sonchus oleraceus</i>	—	—	—
<i>Spartium junceum</i>	Τὸ ἐγχύλισμα γίνεται κίτρινον	Τὸ ἐγχύλισμα γίνεται ὀφρνεύθρον	—
<i>Smyrniium olusatrum</i>	—	—	—
<i>Smyrniium rotundifolium</i>	—	—	—
<i>Zizyphus vulgaris</i>	—	—	—

ΙΣΤΟΡΙΑ. — Περὶ τῶν Γασμούλων τῆς Φραγκοκρατίας, ὑπὸ κ. Δημητρίου
Γρ. Καμπούρογλου.

Περίληψις τῆς ἀλλαγῆς δημοσιευθεσομένης ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἐξῆς:

Ὁ κ. Δ. Καμπούρογλος ὠμίλησε περὶ τῶν Ἑλληνοφράγκων τῆς μεσαιωνικῆς Ἑλλάδος, τῶν χαρακτηριζομένων ὡς Γασμούλων καὶ Βασμούλων, ὡς πρὸς τὰ συνθετικὰ κυρίως μέρη τοῦ ἔρου, μνημονεύσας τὰς διαφόρους γνώμας καὶ σχετίσας τὸν ἔρον αὐτὸν πρὸς τὸν σγαύδαριν τοῦ Βυζαντινοῦ Ἱπποδρόμου καὶ τὸν γάρασδον τοῦ γνωστοῦ Ἰαμβείου· ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν τσάγδαρον τοῦ χρονικοῦ τοῦ Μωρέα, ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν τάγκαρον τοῦ Γουζέλη. Ὑπεστήριξε δέ, ὅτι ὁ γνήσιος καὶ ἀρχικὸς τύπος εἶναι μᾶλλον τὸ βασμούλος, δεχόμενος τὴν γνώμην τοῦ Schmitt ὅτι προῆλθεν οὗτος ἐκ τοῦ bât (bast) (εἶδος σέλας) ἐξ οὗ ἐσχηματίσθη καὶ τὸ bâtard (bastardus) καὶ ἐκ τοῦ piulus, διαφωνήσας δὲ ὡς πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἔρου, μὴ ἐνέχουσαν, κατὰ τὴν γνώμην του, ἐντατικὴν μομφὴν νοθείας, ἀλλ' ἀπλῶς τὴν χαρακτηριστικὴν καὶ ὑποτιμητικὴν πῶς ἔννοιαν τοῦ ἐπιμίκτου ἐξ ἐπιδρομῆς, ἂν μὴ καὶ τοῦ πολεμικοῦ τοιοῦτου.