

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ὁ κ. **Κωνσταντῖνος Ζέγγελης** ἐξελέγη ἀντιπρόεδρος τῆς Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἑπιστημῶν διὰ τὸ ἔτος 1939.

Ὁ κ. **Κωνσταντῖνος Δημητριάδης** ἐξελέγη ἀντιπρόεδρος τῆς Τάξεως τῶν Γραμμάτων καὶ Καλῶν Τεχνῶν διὰ τὸ ἔτος 1939.

Ὁ κ. **Κυριάκος Βαρβαρέσος** ἐξελέγη ἀντιπρόεδρος τῆς Τάξεως τῶν Ἡθικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἑπιστημῶν διὰ τὸ ἔτος 1939.

## ΑΘΛΟΘΕΣΙΑΙ

Γίνεται δεκτὴ ἡ ἐκ Δρχ. 12.000 δωρεὰ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Κωνστ. Ἀμάντου διὰ τὴν προκήρυξιν Χιακοῦ Γεωργικοῦ βραβείου.

Γίνεται δεκτὴ ἡ ἐκ Δρχ. 20.000 δωρεὰ τοῦ Δήμου Λαμιέων πρὸς βράβευσιν ἱστορικῆς συγγραφῆς περὶ τῆς πόλεως τῆς Λαμίας καὶ τῆς περιφερείας αὐτῆς.

## ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς καταθέτει τὰ πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν ἀποσταλέντα συγγράμματα.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

**ΒΟΤΑΝΙΚΗ.— Champignons nouveaux récoltés en Corinthie, par Jean Politis.**

Cette note contient la description de 19 champignons nouveaux que nous avons récolté en Corinthie près de Trikkala.

*Alternaria Fici* J. Politis nov. spec.

Caespitulis late effusis, stratum velutinum primum atro-olivaceum demum fuligineum constituentibus; conidiophoris fasciculatis, brevibus, continuis, apice rotundatis, fuligineis; conidiis superimpositis, clavatis, maturis fuligineis, 3-transverse septatis ibique constrictulis, et 1-3 septis longitudinallibus muriformi divisis,  $40-50 \times 16-18$ .

Hab. in ramis decorticatis locis humidis dejectis *Fici Caricae*.

*Asteroma Smyrnii*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis gregariis, in maculis obsoletis, atris, globosis, minutis, astomis, fibrillis ramosis, numerosis, radiantibus cinctis; sporulis bacillaribus, rectis, utrinque obtusis, 2 guttulatis, hyalinis,  $3-4 \times 0,5$ .

Hab. in foliis caulibusque emortuis *Smyrnii rotundifolii*.

*Camarosporium Fici*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, globoso-conicis, papillatis, primum immersis dein erumpentibus, atris; sporulis oblongo-ovoideis, 3-septatis, leniter constrictis, loculis 1 v. pluribus longitudinaliter divisis, fuligineis,  $26-40 \times 10-14$ .

Hab. in ramulis emortuis *Fici Caricae*.

*Coniothyrium Crataegi*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis gregariis, minutis, subepidermicis, dein leviter erumpentibus, sphaeroideis, brunneis,  $100-160 \mu$ . diam.; ostiolo rotundo contextu parenchymatico atro-brunneo; sporulis ellipsoideis atro-olivaceis, simplicibus  $8-10 \times 4-4,5$ ; sporophoris minutis.

Hab. in rammulis emortuis *Crataegi Oxyacanthae*.

*Coniothyrium Ballotae*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis gregariis, primum tectis, dein erumpentibus, globosis v. globoso-oblongis, depressis, atris,  $120-140 \mu$ . diam.; ostiolo minuto, rotundo, papillato; contextu parenchymatico, atro-fuligineo; sporulis ovoideis, v. ellipsoideis, atro-olivaceis  $8-9 \times 5-6$ , continuis, eguttulatis; sporophoris minutis.

Hab. in caulibus emortuis *Ballotae acetabulosae*.

*Coniothyrium Juniperi*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, minutis globosis, subepidermicis, dein leviter erumpentibus et prominulis, nigris; contextu tenui, atro-brunneo, parenchymatico; sporulis ellipsoideis, copiosissimis, atro-olivaceis, eguttulatis, continuis,  $7-9 \times 4,5-5$ ; sporophoris minutis, obsoletis hyalinis.

Hab. in fructibus (galbulis) siccis *Juniperi Oxycedri*.

*Coniothyrium Quercinum*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, punctiformibus, sphaeroideis primum subepidermicis, demum ostiolo minuto papillulato erumpentibus; contextu fuligineo parenchymatico; sporulis copiosissimis, ovoideis, continuis, olivaceo-brunneis,  $4-5 \times 2-2,5$ ; Sporophoris non visis.

Hab. in ramulis emortuis *Quercus cocciferae*.

*Cryptostictis Phlomidis*, J. Politis, nov. spec.

Picnidiis sparsis, immersis dein erumpentibus, globoso-lenticularibus nigris,  $200-300 \mu$  diam.; sporulis subclavatis, 2-septatis,  $18-20 \times 5$ ; loculis 2 brunneis, supero 3-4 setulis brevibus divaricatis armato, infimo hyalino, in pedicellum, duplo triplove longiorem, producto.

Hab. in caulibus siccis *Phlomidis fruticosae*.

*Cytospora Spartii*, J. Politis, nov. spec.

Stromatibus sparsis, subcutaneis, dein pustulato-erumpentibus, nigris, suborbicularibus; loculis paucis, latiusculis, in ostiolum unicum confluentibus; sporulis hyalinis, numerosissimis, curvatis, alantoideis,  $6-8 \times 1-1,5$  sporophoris filiformibus hyalinis, 16-18

Hab. in ramulis emortuis *Spartii juncei*.

*Diplodina Scolimi*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis copiosis sparsis subcutaneo-erumpentibus, atris minutis, globoso-depressis, poro minutissimo praeditis, brunneis, contextu parenchymatico,  $200-250 \mu$  diam.; sporulis hyalinis, initio continuis demum bicellularibus oblongo-fusoideis, rectis, vel leniter curvulis, utrinque rotundatis, 4 guttulatis, hyalinis,  $8-10 \times 1,5-2$ ; sporophoris simplicibus, brevibus, hyalinis.

Hab. in caulibus emortuis *Scolymi hispanici*.

*Diplodina Stachydis*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis aggregatis, v. sparsis, globosis, initio tectis, dein erumpentibus,  $100-120 \mu$  diam., contextu parenchymatico obscure brunneo; sporulis cylindraceis, utrinque rotundatis, medio 1-septatis, non constrictis, hyalinis,  $10-12 \times 2$ ; sporophoris non visis.

Hab. in caulibus emortuis *Stachydis creticae*.

*Hendersonia Platanicola*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, epidermidem perforantibus, aplanato-globosis; poro rotundo pertusis; contextu parenchymatico brunneo; sporulis rectis, oblon-



go-ellipticis, apicibus rotundatis, 1-3-septatis, brunneis, 10-12 × 5-5,5.

Hab. in petiolis foliorum *Platani orientalis*.

*Hendersonia Viticola*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, immersis, dein ostiolo conico erumpentibus, nigris 200-300 μ. diam.; contextu tenui extus atro-brunneo intus flavido, parenchymatico; sporulis oblongo-ovoideis, 1-3 septatis non vel vix constrictis olivaceo-brunneis, 16-20 × 4-5; sporophoris filiformibus, usque ad 26 μ. longis, 2,5-3 μ. crassis.

Hab. in sarmentis emortuis *Vitis viniferae*.

*Hendersonia Crataegi*, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis, subcutaneo-erumpentibus, globosis, 220-260 μ. diam.; poro obsoleto pertusis, nigricantibus; contextu parenchymatico, brunneo; sporulis ellipsoideis v. ovato-oblongis, 1-3 septatis, ad septa leviter constrictis; pluriguttulatis, brunneis, 14-16 × 3,5-4. Sporophoris brevibus, papilliformibus hyalinis.

Hab. in ramulis emortuis *Crataegi Oxyacanthae*.

*Leptosphaeria Coronillae*, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, minutis, subglobosis, tectis, ostiolo breviter papillato erumpentibus, atris; ascis cylindraceo-clavatis, stipitatis, densissime paraphysatis, octosporis, 60-70 × 10-12; sporidiis distichis, fusioideis, 3-septatis, ad septa vix constrictis 15-16 × 3,5-4 flavo-brunneis.

Hab. in ramulis *Coronillae emeroidis*.

*Leptosphaeria eryngiana*, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, punctiformibus, globulosis, nigris initio epidermide velatis dein erumpentibus, 250-300 μ. diam.; ascis clavatis, paraphysibus filiformibus obclavatis, octosporis, stipitatis, 100-120 × 10; Sporidiis distichis fusioideis, saepe curvulis, 3-septatis, ad septa vix constrictis, 30-32 × 3,5-4 flavidis.

Hab. ad caules et petiolos exaridos *Eryngii campestris*.

*Leptosphaeria Clematidis*, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis gregariis primo tectis dein erumpentibus, nigris, ostiolo minuto papilliformi praeditis 160-200 μ. diam.; ascis oblongo-cylindraceis, breve stipitatis, octosporis, 45-50 × 6-7; sporidiis distichis fusioideis, 3-septatis, ad septa constrictis, utrinque obtusis, fusco-olivaceis, 16-18 × 4.

Hab. in sarmentis *Clematidis Vitalbae*.

*Leptosphaeria Briosi*, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, epidermide initio tectis dein erumpentibus nigris, glabris, membranaceis, ostiolo minuto papilliformi praeditis, 180-220 m. diam., ascis clavatis, breve stipitatis, octosporis, 80-90 × 9-10; sporidiis distichis, fusioideis utrinque acutulis, 4-septatis ad septa non constrictis, loculis plerumque guttulatis, flavidulis 20-22 × 3-4; paraphysibus, filiformibus, hyalinis.

Hab. in caulibus siccis *Scrofulariae peregrinae*.

*Leptosphaeria Platani*, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis epidermide tectis, subglobosis, minutissime papillatis, atris; ascis cylindraceo-clavatis, breve stipitatis, apice late rotundatis, octosporis; 90-110 × 14-16; Sporidiis distichis, clavatis rectis, 3 septatis, ad septa vix constrictis apice rotundatis deorsum in cellulas attenuatas desinentibus, primum hyalinis dein brunneis, loculis plerumque guttulatis, 12-16 × 4-5; paraphysibus simplicibus, filiformibus.

Hab. in ramis emortuis *Platani orientalis*.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ.—Περὶ τοῦ ἀξιώματος τῶν Μητροπολιτῶν,  
ὑπὸ Κωνστ. Μ. Πάλλη\*.

Ι.—Ἡ μητροπολιτικὴ διοίκησις ἡ πλείονας περιλαμβάνουσα ἐπισκοπὰς ἀποτελοῦσα δὲ τὴν μέσσην βαθμίδα μεταξὺ ἀπλῶν ἐπισκόπων καὶ πατριαρχῶν ἀπαντᾷ ἀπὸ τοῦ δ' αἰῶνος ἐν τε τῇ Ἀνατολῇ<sup>1</sup> καὶ ἐν τῇ Δύσει, ὡς ἐν τῇ βορείῳ Ἰταλίᾳ<sup>2</sup>, ἐν Γαλλίᾳ<sup>3</sup>.

\* Ἐξήγησις συντετμημένων λέξεων:

Ε. Α.=Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια.

Ε. Ε. Κ.=Ἐπαρχιακὰ ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὸ Ἰωάννου Σοκολόφ.

Ι. Σ.=Ἱερὸς Σύνδεσμος.

Κ. Κ.=Κρητικὸν Καταστατικόν.

Κτ.=Kirchenrecht.

Π.=Πατριάρχης καὶ δὴ ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐφ' ὅσον δὲν δηλοῦται ἕτερος.

Συντ.=Σύνταγμα ἱερῶν κανόνων, ἔκδ. Γ. Α. Πάλλη καὶ Μ. Ποτλῆ.

<sup>1</sup> Ὡς πρὸς τοὺς μητροπολίτας τοῦ πατριαρχικοῦ τῆς Ἀντιοχείας κλίματος μεσοῦντος τοῦ 5' αἰῶνος ὅρα F. NAU, Les suffragants d'Antioche au milieu du VI<sup>e</sup> siècle, ἐν *Revue de l'Orient chrétien*, 2<sup>e</sup> série, IV, 1909, σ. 209-219, ἔνθα συμπληροῦνται καὶ διορθοῦνται τὰ ὑπὸ τοῦ Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως δημοσιευθέντα, ὑπὸ τοῦ VAILHE δὲ ἐν *Echos d'Orient*, X, λεπτομερῶς ἐξετασθεὶς κατάλογος ἐκ τοῦ παρισιακοῦ κώδικος, Suppl. gr., 1226, XIII.

<sup>2</sup> Αἱ ἀρχαιότεραι τῶν μητροπόλεων τῆς βορείου Ἰταλίας ἦτοι τὸ Μεδιόλανον, ἡ Ἀκυληά καὶ ἡ