

CONTRIBUTION

A L'ÉTUDE DES CHAMPIGNONS DE L'ATTIQUE*

PAR JEAN CH. POLITIS

Wheler, botaniste anglais, a herborisé, en 1675, aux environs d'Athènes, dans les îles de Zante et de Corfou et au mont Parnasse. Après lui, Sibthorp, professeur de botanique à l'Université d'Oxford, et membre des Sociétés Royale et Linnéenne de Londres, accompagné du docteur Hawkins, fit deux voyages en Orient: le premier, de 1785 à 1787, le second, de 1794 à 1795. Il parcourut la Grèce et une partie de l'Asie Mineure et y recueillit un grand nombre de plantes. Les environs d'Athènes furent explorés pendant le premier voyage. Les collections de Sibthorp furent publiées dans le *Prodromus, Florae Graecae*, puis dans le *Flora Graeca*, ouvrage, qui contient les descriptions et les figures de 966 plantes dessinées par le peintre Ferdinand Bauer.

Après Sibthorp, l'éminent amiral et botaniste français Dumont d'Urville, explora, en 1819 et 1820 les îles de l'Archipel et les côtes de l'Attique; il a donné le catalogue de ses récoltes dans son *Enumeratio Plantarum*.

En 1836, le naturaliste Aucher Eloy a herborisé aux environs d'Athènes.

Ed. Boissier, au printemps de 1842, explora les pentes occidentales de l'Hymette, les bords de la mer entre Phalère et le Pirée, le Pentélique et le Parnès. Ses riches collections ont été publiées de 1842 à 1859 avec celles d'un grand nombre d'autres voyageurs, dans les dix-neuf fascicules de ses *Diagnoses Plantarum Orientalium*.

Spruner, chirurgien militaire à Athènes, a exploré de 1840 à 1843 l'Attique et d'autres localités de la Grèce. Il a fourni des plantes grecques à beaucoup d'herbiers d'Europe.

Heldreich, directeur du Jardin Botanique d'Athènes, de 1844 à 1902, a étudié la flore de l'Attique comme celle d'autres parties de la Grèce. Les plantes nou-

* Άνεκρινώθη κατά την συνεδρίαν 23 Μαΐου 1935. Πρακτικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 10, σ. 248.

velles de ses voyages botaniques ont été publiées pour la plupart en collaboration avec Boissier dans ses *Diagnoses Plantarum Orientalium novarum*. Heldreich publia en outre die *Pflanzen der Attischen Ebene* 1877, plusieurs autres ouvrages concernant la flore de la Grèce et une collection de plantes grecques desséchées sous le titre de *Herbarium Graecum Normale*.

Orphanidès, professeur de Botanique à l'Université d'Athènes, qui, avec ardeur a étudié de 1848 à 1865 la flore de sa patrie, a herborisé presque chaque année en Attique. Les recherches et les découvertes d'Orphanidès ont été connues dans le monde scientifique par une collection importante de plantes grecques desséchées, publiées par lui sous le titre de *Flora Graeca exsiccata*. Orphanidès a voulu communiquer à Boissier toutes les plantes de ses récoltes dont les espèces nouvelles ont été publiées dans les *Diagnoses*.

Après ces travaux, Halacsy publia l'ouvrage intitulé *Conspectus Florae Graecae*, en trois volumes et deux suppléments, dont la publication a commencé en 1901 et s'est achevée en 1912. Dans cet ouvrage sont mentionnées les plantes trouvées jusqu'à cette époque en Grèce et une bibliographie complète de la flore grecque.

De ce qui précède, on voit que la flore de l'Attique a été l'objet de nombreuses recherches. Mais ces recherches concernent surtout les Spermatophytes.

Voici l'histoire des recherches concernant les sporiophytes de l'Attique :

F. Schmitz¹ en 1878 s'est occupé des Algues vertes de la baie de Phalère.

En 1901 J. B. de Toni² publia dans la revue algologique «La Nuova Notarisia» un catalogue des algues récoltées au cap Sunium par A. Forti; ce catalogue contient 43 espèces dont la plupart appartiennent aux Diatomées.

Enfin, R. Maire en plus des phanérogames s'est occupé aussi de l'étude des cryptogames de la Grèce et les résultats de ses recherches ont été publiés dans différents mémoires³. On voit donc, d'après ce qui a été dit plus haut, que la connaissance de la flore cryptogamique de l'Attique, comme celle du reste de la Grèce, était très incomplète. Nous avons entrepris de combler ces lacunes par l'étude suivie des Thallophytes de la Grèce.

En 1921 nous avons parcouru la Macédoine pour l'étude de sa flore et nous

¹ SCHMITZ F. Über grüne Algen aus dem Golf von Athen. *Sitzungsber. der Naturf. Gesellschaft*, Halle, 1878.

² DE TONI J. B. Alghe raccolte al Capo Sunio dal Dott. Achille Forti, *La Nuova Notarisia*, p. 88, 1901.

³ COPPEY A. Contribution à l'étude des Muscinées de la Grèce, Nancy, 1908. Deuxième contribution à l'étude des Muscinées de la Grèce, Nancy, 1909. HARMAND J. et MAIRE R. L'étude des Lichens de la Grèce, Nancy, 1909.

avons recueilli au mois d'Août, 140 espèces d'algues marines sur les côtes de la péninsule de l'Athos. Nous avons publié les résultats de ces recherches dans les Annales de la Faculté des Sciences de l'Université d'Athènes¹.

Pendant l'été de 1923 nous avons séjourné près de deux mois dans les îles d'Andros, Tinos et Syra et nous nous sommes occupé de l'étude de leur flore marine; nous avons publié les résultats de nos recherches dans les Praktika de l'Académie d'Athènes² et dans le Bulletin de la Commission Thalassographique Hellénique. Nous avons publié plus tard deux autres travaux algologiques, l'un concernant la flore marine, de l'île de Crète³, et l'autre les recherches sur les plantes marines de la Grèce⁴. Nous nous sommes occupé, en outre, de l'étude de la flore marine de l'Attique⁵ et les résultats de nos recherches ont été publiés dans un mémoire de l'Académie d'Athènes. En dehors de la collection et de la détermination d'Algues, nous avons étudié la flore mycologique de l'Attique du Péloponèse et celle d'autres parties de la Grèce et nous avons publié quelques travaux qui concernent les champignons⁶.

Pendant nos recherches algologiques et mycologiques nous avons trouvé en Attique seulement plus de 500 espèces d'algues et de champignons dont 400 à peu près n'avaient pas été signalés en Grèce. Plusieurs de ces espèces sont nouvelles pour la sciences. Nous nous bornons pour le moment à publier le catalogue des champignons que nous avons recueillis en Attique, réservant pour l'avenir la publication de nos recherches sur les champignons d'autres parties de la Grèce.

¹ POLITIS J. Algues marines de la péninsule d'Athos, *Annuaire de la Faculté des Sciences de l'Université d'Athènes*, 1925.

² POLITIS J. Étude sur la flore maritime de l'île de Syra, *Bulletin de la Commission Thalassographique Hellénique*, Athènes, 1928 et *Praktika de l'Académie d'Athènes*, 1927, p. 480.

³ POLITIS J. Algues marines de l'île de Crète, *Rapports de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée*, 8, p. 257.

⁴ POLITIS J. Plantes marines de la Grèce, *Rapports de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée*, p. 195, 1930.

⁵ Ι. ΠΟΛΙΤΟΥ Περί τῆς θαλασσίας χλωρίδος τῆς Ἀττικῆς, *Πραγματεία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθην.*, 1934.

⁶ POLITIS J. Sulla Flora Micologica della Grecia, *Atti dell' Istituto Botanico della R. Università di Pavia*, 15, p. 73.— DU MÊME, Un champignon nouveau parasite des feuilles du *Doronicum Caucasicum* Marsch., *Comptes rendus de l'Académie d'Athènes*, 2, 1926, p. 149.— DU MÊME, Sur les rouilles des graminées en Attique, *Comptes rendus de l'Académie d'Athènes*, 4, 1929, p. 190.

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS DE L'ATTIQUE

Classis BASIDIOMYCETAE

Fam. LYCOPERDACEAE

LYCOPERDON

Lycoperdon Bovista Linn.—Sacc., Syll., VII, p. 109.

Attique. Bois, Prairies, près de Tatoï.

Lycoperdon gemmatum Batsch.—Sacc., Syll., VII, p. 106.

Attique. Bois, Prairies, près de Tatoï.

Fam. AGARICACEAE

LEPIOTA

Lepiota excoriata Schaeff. t. 18, 19, Vivian. t. 49, Vittad. Fung. mang. t. 35, Ventur. t. 7, Letell. t. 610. Krombh. t. 24, f. 24-30. Sacc., Syll., V, p. 31.

Attique. Prairies, près de Tatoï.

ARMILLARIA

Armillaria mellea (Vahl.) Fr. Fl. Dan. t. 1013. Grev. t. 332. Krombh. t. 43, f. 2-6, Vittad. Fung. Mang. t. 3. Vivian t. 51. Fr. atl. Svamp. t. 36. Sacc., Syll., V, p. 80.

Attique. Sur divers arbres.

Armillaria mori Paul. Champ. p. 300, t. 144, f. 1-7 (Hypophyll) Batt. t. 10. f. F. Fr. Epicris. p. 23, Hym. Eur. p. 45. Sacc., Syll., V, p. 81.

Attique. Sur des *mûriers*, près de Ménidi.

TRICHOLOMA

Tricholoma sordidum Fr. Syst. Myc. I, p. 51. Sacc., Syll. V, p. 139.
Attique. *Pinèdes*, près de Tatoï.

Tricholoma murinaceum Bull., Champ. Fr. t. 520. Fr., Hym. Eur. p. 62.
Sacc., Syll. V, p. 109.
Attique. *Pinèdes*, près de Tatoï.

CLYTOCYBE

Clytocybe geotropa (Bull.) Pr. Bull. t. 573, f. 2 (Agar.), Hussey I, t. 66.
Harz. t. 75, Lettell. t. 670, Paul. t. 112, Fr. Hym. Eur. p. 96. Sacc., Syll. V, p. 171,
Attique. Près de Tatoï.

Clytocybe gilva Pers. Syn. p. 448, pr. parte (Agar.), Fr. S. M. p. 80, Fl.
Dan. t. 1011, Weinm. Ross. p. 78. Pers. Myc. Eur. 3. Sacc., Syll. V, p. 170.
Attique. Sur les troncs d'arbres.

COLLYBIA

Collybia velutipes Curt. Lond. 4, t. 70 (Agar.), Fr. S. M. I, p. 119, ubi syn.
et varr. Hym. Eur. pag. 115, Bolt. t. 135, Sow. t. 384, f. 3. Sacc., Syll. V, p. 212.
Attique. Sur les troncs de Salix.

PLEUROTUS

Pleurotus spodoleucus Fr. Syst. Myc. I, p. 182, Icon. t. 87, f. 1, Hym.
Eur. p. 172. Sacc., Syll. V, p. 349.
Attique. Au pied des troncs de Quercus.

PAXILLUS

Paxillus involutus (Batsch.) Fr. Epicr. p. 317, Sverg. atl. Svamp. t. 75,
Hym. Eur. p. 403, Gill. C. F. c. ic., Berk. Outl. t. 12, f. 5, Ic. Hoffm. t. 10, f. 2.
Sacc., Syll. V, p. 987.
Attique. *Pinèdes*, près de Tatoï.

LACTARIUS

Lactarius deliciosus (L.) Fr. Sacc. Syll. V, p. 438. Epicr. p. 341, Sverig.
atl. Svamp. t. 6, Hym. Eur. p. 431, Gill. C. F. cum icone, Hussey I, t. 67.
Attique. Bois de *Conifères*.

RUSSULA

Russula violacea Quel. in Ass. Fr. Avanc. Sc. 1882, p. 11, t. XI, f. 3. Sacc.,
Syll. V, p. 463.
Attique. Forêts de *Conifères*.

Russula nigricans (Bull.) Fr. Ep. p. 350, Hym. Eur. p. 439, Huss. I, t. 73, Berk. Outl. p. 209, Gill. C. F. c. icon. Seyn. t. IV, f. 4. Sacc., Syll., V, p. 453.

Attique. *Pinèdes*.

LENTINUS

Lentinus ursinus Fr. Epicr. p. 395, Hym. Eur. p. 486, Bres. Trid. t. 66, *Agaricus* Fr. S. M. I. p. 185. Sacc., Syll., V, p. 608.

Attique. Imbriqué sur souches pourries (Montagnes).

Fam. POLYPORACEAE

POLYPORUS

Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I, p. 357., Hym. Eur. p. 542, Sverig atl. Svam. t. 88, Sacc., Syll. VI, p. 104.

Attique. Sur *Prunus Armeniaca*, près de Marousi.

Polyporus Tamaricis (Pat.) Sacc. et D. Sacc. — *Xanthochrous Tamaricis* Pat. Bull. Soc. Mycol, 1904, pag. 51. — *Polyporus Rhacodes* Bres. Trid. II, p. 30, t. 136., Sacc. Syll. VI, p. 111.

Attique. Sur *Tamarix*, près de Phalère.

Polyporus hispidus (Bull.) Fr. Sacc. Syll., VI, p. 129.

Attique. Sur divers arbres.

Polyporus versicolor (Linn.) Fr. — Sacc., Syll., VI, p. 253, Hym. Eur. p. 568, Hussey I, t. 24, Boletus Linn. Succ. n. 1254, Bull. t. 86, Bull. t. 81.

Attique. Sur les troncs d'arbres.

FOMES

Fomes igniarius (L.) Fr. Syst. Myc. I, p. 375, Hym. Eur. p. 559, Gill. Champ. c. ic., Pers. Myc. Eur. 2, p. 81, Sacc. Syll. VI, p. 180.

Attique. Sur *Chêne*.

TRAMETES

Trametes Pini (Brot.) Fr. S. M. I, p. 336, El. p. 68, Hym. Eur. p. 582, Klotzich Bor. t. 380, Berg. Outl. p. 253, Boletus Brot. Lusit. II, p. 468, Sacc., Syll., VI, p. 345.

Attique. Sur les troncs de *Pins*.

Fam. THELEPHORACEAE

STEREUM

Stereum hirsutum (W.) Fr. Epicr. p. 549, Hym. Eur. p. 639, Huss. I, t. 58, Perk. Outl. t. 17, f. 7, Sacc., Syll., VI, p. 563.

Attique. Sur les troncs d'arbres.

Fam. UREDINACEAE

MELAMPSORA

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast. Cat. plant. Mars. pag. 205, Wint. Die Pilze p. 240, Schroet. Pilz. Schles. p. 359. Sacc., Syll., VII, p. 586.—*M. Euphorbiae* Tul.—*Uredo punctata* D C.

Sur les feuilles d'*Euphorbia helioscopia* et *E. Peplus*: Attique, près de Sépolia.

COLEOSPORIUM

Coleosporium Senecionis (Pers.) L  x.—Sacc., Syll., VII, p. 751. Fries Summa Veg. Scand. p. 512, Winter. Die Pilze, p. 248, Schroet. Die Pilze Schles. p. 368.—*Uredo farinosa* var. *Senecionis*, Pers. Syn. Fung. p. 218.

Sur les feuilles de *Senecio vulgaris*: Attique, près de Kiphissia.

Coleosporium Inulae (Kunze) Ed. Fisch.

Sur *Inula Attica*. Salamine, Cith  ron.

UROMYCES

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet.—Sacc., Syll., VII, p. 545. Brand. p. 10, Winter. Die Pilze, p. 149.—*Lycoperdon caryophyllum* Schrank. Baierische Flora II, p. 668.—*Uredo Dianthi* Pers. Syn. Fung. p. 222.

Sur les feuilles et les tiges de *Dianthus caryophyllus*: Attique, S  polia.

Uromyces Anagyridis Roumegu  re.—Sacc., Syll., VII, 558.

Sur *Anagyris foetida*: Attique, près de Marousi.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fuck. Symb. myc. p. 64, Winter. Die Pilze p. 154, Burrill. Paras. Fungi of III. p. 164, Schroet. Pilz. Schles. p. 301. Sacc., Syll., VII, p. 533.

Sur les feuilles de *Polygonum aviculare*: Attique, près d'Ath  nes.

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint. Die Pilze p. 145, Schroet. Pilz. Schles. p. 307.—*Uredo Rumicis* Schum. Pl. Saell. II, p. 231. Sacc., Syll., VII, p. 544.

Sur les feuilles de *Rumex*. Attique, près d'Ath  nes.

Uromyces Scillarum (Grew.) Wint. in Hedwigia 1885, p. 259. Sacc., Syll., VII, p. 567.

Sur *Muscari comosum*. Attique, près d'Ath  nes.

Uromyces striatus Schroet. in Abhandl. Schles. Ges. 1869, p. 11, Pilz. Schles. p. 307.—*Uromyces Medicaginis* Pass in Th  m. Herb. myc. oecon. n. 156 (1872).—*Uromyces Medicaginis-falcatae* Wint. Die Pilze p. 159, Sacc., Syll., VII, p. 542.

Sur *Medicago sativa*. Attique, près d'Ath  nes.

Uromyces Terebinthi (DC.) Wint. Die Pilze p. 147, Burrill Paras. Fungi of Illinois p. 158.—*Uredo Terebinthi* D. C. Fl. Franc. VI, p. 71, Sacc., Syll., VII, p. 552.

Sur les feuilles de *Pistacia Terebinthus*. Attique, près du Monastère du Pentélique.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév. Winter Die Pilze p. 159, Schroet. Pilz. Schles. p. 301.—*Puccinia Trifolii* Hedw. Fungi ined. t. 18. Sacc., Syll., VII, p. 534.
Sur *Trifolium repens*. Attique, près de Patissia.

Uromyces Fabae (Pers.) De By. in Ann. Scienc. Nat. IV, 1863, tom. XX, Burrill. Paras. III, p. 161, Schroet. Pilz. Schles. p. 298.—*Uredo Fabae* Pers. in Romer Magazin. I, p. 93. Sacc., Syll., VII, p. 531.

Sur les feuilles de *Vicia Faba*. Attique.

GYMNOSPORANGIUM

Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) Wint. Die Pilze p. 232, Schroet. Pilz. Schl. p. 357.—*Roesteliaca cancelata* Reb. Sacc., Syll., VII, p. 739.

Sur les feuilles de *Pirus communis*. Attique, près de Moschaton et Kiphissia.

PUCCINIA

Puccinia Eryngii DC., Encycl. VIII, p. 249 (1808) et Fl. franç. VI, p. 1815, Sacc., Syll. VII, p. 167.

Sur *Eryngium campestre*. Attique, près de Maroussi.

Puccinia Chrysanthemi Roze.—Sydow Monog. Ured. I, p. 46.—*P. Tanacetii*, Sacc., S. XVI, p. 296.

Sur les feuilles de *Chrysanthemum indicum*. Athènes.

Puccinia Cichorii (DC.) Belli.—Sydow Monog. Ured. I, p. 49. Sacc., Syll. XVII, p. 311, Fischer Ured. p. 227.

Sur les feuilles de *Cichorium Intybus*: Attique, près de Kolokythou.

Puccinia Barbeyi P. Magn.—Sacc., Syll., XVI, p. 305.

Sur *Asphodelus fistulosus*. Attique, près de Patissia.

Puccinia Opoponacis Ces. in Bull. Club. Alp. ital. 1873, p. 150. Sacc., Syll., VII., p. 725, Sydow. Mon. Ured. I, p. 397, Lindroth, l. c., p. 69.

Sur *Opopanax hispidus*. Attique, près de Kiphissia.

Puccinia Cynodontis Desm. Exsicc. III, p. 665, Winter Die Pilze p. 180, Sacc., Syll., VII, p. 661.

Sur les feuilles de *Cynodon Dactylon*. Attique, près de Patissia.

Puccinia Cardui - pycnocephali Sydow.

Sur *Carduus pycnocephalus*. Attique, près de Patissia.

Puccinia Glumarum (Schm.) Erikss. et Henn. — Sydow. Mon. Ured. I, p. 706.

Sur *Haynaldia villosa* et *Aegilops ovatus*. Attique, près de Kiphissia et Koropi.

Puccinia Graminis Pers. Disp. Fung. p. 39, t. 3, f. 3. Winter Die Pilze, p. 517, Schroet. Pilz. Schles. p. 322. — *Lycoperdon poculiforme* Jacq. Coll. I, p. 122, Sacc., Syll., VII, p. 622.

Sur *Avena sativa* et *Hordeum Vulgaris*. Attique, près de Kiphissia et Koropi.

Puccinia Helianthi Schwein. Syn. Caral. pag. 73, Schroet. Pilz. Schles., p. 315, Sacc., Syll., p. 603.

Sur *Helianthus annuus*. Athènes.

Puccinia Cirsii-lanceolati Schroet. in Pilze Schles. pag. 317 (1889), Sacc. Syll., VII, p. 606.

Sur *Pycnomon Acarna*. Attique, près d'Athènes.

Puccinia Allii (DC.) Rud. in Linnae IV, pag. 392, Winter Die Pilze p. 184. Sacc., Syll., VII, p. 605.

Sur *Allium sativum*. Attique.

Puccinia Maydis Bereng. — Sydow., Mon. Ured., p. 830.

Sur les feuilles de *Zea Mays*: Attique, près de Moschaton.

Puccinia Menthae Pers. Syn. Fung. p. 227. Wint. Die Pilz. p. 204, Schroet. Pilz. Schles. p. 321. — *Aecidium Menthae* DC. Flor Franc., IV, p. 95. Sacc., Syll., VII, p. 617.

Sur les feuilles de *Mentha Pulegium*. Attique, près de Moschaton.

Puccinia Rhagadioli Sydow., Mon. Ured. I, p. 139, Sacc. S. XVII, p. 307.

Sur *Rhagadiolus stellatus*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Pimpinellae (Strauss) Link. Sp. II, p. 77, Winter Die Pilze p. 212, Schroet. Pilz. Schles. p. 321. Sacc., Syll., VII, p. 616.

Sur *Pimpinella cretica*. Salamine.

Puccinia Poarum Niels. in Botanisk Tidsskrift, III, Reihe, Bd. 2, p. 26 et seq. — *Lycoperdon epiphyllum* L. Sp. plant II, p. 1655. Sacc., Syll., VII, p. 625. — *Aec. Tussilaginis*, Pers.

Sur *Poa annua*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Pruni-spinosae Pers. Syn. Fung. p. 226 (sub. nom: *P. Prnni-spinosae*) Schroet. Pilz. Schles. p. 341, Winter die Pilze p. 193. — *Uredo Prunastri*.

DC. Fl. Franç., VI, p. 85.—*P. Salicum Prunorum* Link Sp. II, p. 82.—*P. discolor* Fuck. Symb. p. 50. Sacc., Syll., VII, p. 648.

Sur *Prunus Armeniaca* et *P. domestica*. Attique, près de Vasilikon et Sépolia.

Puccinia simplex (Koern.) Eriks. et Henn.—Sydow. Monog. Ured. I. p. 756.

Sur *Hordeum murinum*, *Hordeum vulgare* et *Heinaldia vilosa*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Sonchi Rob. et Desmaz. in Ann. Scienc. Nat. 1849, III ser., II, p. 274, Winter Die Pilze p. 189. Sacc., Syll., VII, p. 638.

Sur les feuilles de *Sonchus oleraceus*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Vincae (D C.) Berg.—Sydow. Mon. Ured., I, p. 338, Sacc. Syll. IX, p. 310, Fischer Ured. p. 167.

Sur les feuilles de *Vinca major*. Attique, près d'Athènes.

Puccinia crepidicola Sydow, Öst. bot. Zeitschr. 1901, p. 17, 27, Sacc. Syll. XVI, p. 292, Sydow, Mon. Ured. I, p. 71, n. 103, Fischer, Ured. p. 234.

Sur *Crepis Fraasii*. Attique, Parnès.

Puccinia Agropyri Ell et Ev.—*Aecidium Clematidis* D C.

Sur *Agropyrum pycnanthum*: Attique, près de Kiphissia, Marousi et Sépolia.

Puccinia dispersa Erikss et Henn.

Sur *Secale cereale*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Lolii Niels. Ugeskrift. for Ländmaend 1872, Bd. I, p. 549, Botan. Tidskr. 1877, Bd. II, p. 39.

Sur *Lolium perenne* et *Koeleria phleoides*. Attique, près de Koropi.

Puccinia Malvacearum Mont. in Gay Hist. fis. y polit. De Chile VIII, p. 43, Syll. n. 1159, Winter Die Pilze, p. 168, Schroet. Pilz. Schles. p. 347. Sacc., Syll., VII, p. 686.

Sur *Malva silvestris*. Attique.

Puccinia Asphodelii Daby. Bot. Gall. II, p. 891, Bagnis Monogr. tap. IV, fig. 136.—*Uredo Asphodeli* DC. Fl. Fr. VI.—*Cytomyces Asphodeli* Thüm. Contr. Fl. Lusit. p. 12, n. 64. Sacc., Syll., VII, p. 666.

Sur *Asphodelus microcarpus*. Salamine.

Puccinia Centaureae D C., Fl. franç. V, p. 595, Martius, Prodröm. Fl. mosq. 226 Magnus, Öst. bot. Zeitschr. 1902, p. 428, Sydow, Mon. Ured. I, p. 39, n. 63 et p. 853. Fischer, Ured. p. 222.

Sur *Centaurea Calcitrapa*. Attique, près de Kiphissia.

Puccinia Notobasidis, J. Politis, nov. spec.

Teleutosporis ellipsoideis v. late ovatis, apice rotundatis, medio non v. vix constrictis, basi rotundatis, levibus, obscure castaneis, 30-40 × 20-24, pedicello hyalino, brevissimo v. subnullo; uredosporis globosis, v. subglobosis, dilute brunneis, 22-24 μ. diam.; teleutosporis amphigenis maculis nullis v. indistinctis insidentibus, sparsis, minutis, rotundatis, hinc inde confluentibus, pulverulentis, epidermide rupta cinctis, atro-brunneis.

Sur les feuilles de *Notobasis Syriaca*, Attique, près de Podoniphti.

Puccinia Koeleriae, J. Politis, nov. spec.

Uredosporis hypophyllis, sine ordine sparsis, minutis v. mediocribus, plerumque ellipsoideis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, flavis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, echinulatis pallidis, 20-30 × 15-25, poris germ. numerosis praeditis; teleutosporis epiphyllis, sparsis v. in lineas orbiculares dispositis, interdum confluentibus, epidermide tectis atro-brunneis; teleutosporis variabilibus, plerumque clavatis apice truncatis, rotundatis, v. rarius leniter attenuatis, valde incrassatis (5-10 μ.) et obscurioribus, medio leniter constrictis, basi plerumque attenuatis, levibus, dilute brunneis 45-65 × 17-20, pedicelo brevi.

Sur les feuilles de *Koeleria phleoides*. Attique, près d'Athènes.

AECIDIUM

Aecidium Clematidis DC. Fl. Franç. II, p. 243, Thüm. Mycoth. Univ. n. 1221, Winter Die Pilze p. 270. — *Caeoma Vitalbatum* Link Sp. II, p. 54. — *Caeoma (Aecidium) Clematitatum* Schwein. Syn. Amer. bor. p. 293, Sacc., Syll. XVII, p. 774.

Sur *Clematis cirrhosa*. Attique.

Aecidium Chenopodii-fruticosi DC. Fl. Franç. VI, p. 92. — *Coeoma chenophodiatum* Link Sp. II, p. 45. — *Uredo Chenopodii* Spr. Syst. IV, p. 574, Sacc. Syll. VII, 819.

Sur *Suaeda fruticosa*. Attique, près de Glyphada.

UREDIO

Uredo Imperate Magnus.

Sur *Imperata cylindrica*. Attique, près de Patissia.

PHRAGMIDIUM

Phragmidium subcorticium (Schrank) Winter Die Pilze pag. 228, Schroet. Pilz. Schles. p. 353. — *Lycoperdon subcorticium* Schrank in Hoppe. Bot. Tasschb. 1793, pag. 68. — *Uredo Rosae* Pers. Disp. p. 13. — *Puccinia mucronata* var. *Rosae*

Pers.— *Uredo Rosae-centifoliae* Pers. Syn. Fung. p. 215, Sacc. Syll. VII, pag. 744.
Sur *Rosa centifolia*, *R. Canina*, *R. gallica*. Attique.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint. Die Pilze p. 231, Schroet. Pilz. Schless. p. 353.— *Puccinia violacea* Schultz. Prodr. Fl. Starg. p. 459.— *Phragmidium aspernm* Wallr. Fl. Crypt. germ. II, p. 188.— *Uredo Verpris* Rob. in Desm. Fl. Crypt. I, n. 2122.

Sur *Rubus fruticosus*. Attique.

Fam. USTILAGINACEAE

USTILAGO

Ustilago Hordei (Pers.) Kellerm et Swingle. — *Ustilago Jensenii* Rostr. Sacc. Syll. IX, p. 283.

Sur *Hordeum vulgare*. Attique.

Ustilago Schweinfurthiana Thüm. in Mycoth. Univ. n. 726, Sacc. Syll. VII, p. 457.

Sur *Imperata cylindrica*. Attique, près de Patissia.

Ustilago Avenae (Pen.) Jens. Sacc. Syll. IX, p. 283.

Sur *Avena sativa*. Attique.

Ustilago nuda (Jens.) Kellerm et Swingle.— *Ustilago Hordei* Breff., Sacc. Syll. IX, p. 283.

Sur *Hordeum vulgare*. Attique.

Ustilago Tritici (Perss.) Jens.—Sacc., Syll. IX, p. 283.

Sur *Triticum vulgare*. Attique.

UROCYSTIS

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh. Fungi eur. n. 396, Winter Die Pilze p. 120, Schröt. Pilz. Schles. p. 280, Fisch Aperçu p. 38.— *Polycystis Colchici* Straus in Sturm D. C. Fl. p. 45.— *Cocoma Colchici* Schlecht. in Linnaea I, p. 241.— *Uredo Colchici* Link Handb. III, p. 345, Sacc. Syll. VII, p. 516.

Sur *Allium neapolitanum* Attique, près de Moschaton.

TILLETIA

Tilletia levis Kühn in Rabenh. Fungi Europaei n. 1697, Fisch. Aperçu pag. 47, Winter Die Pilze pag. 109, Schroet. Pilz. Schles. p. 277.— *Ustilago foetens* Berk. et Rurt. in Grevillea 1874, p. 59, Sacc. Syll. VII, p. 485.

Sur *Triticum vulgare*. Attique.

Tilletia Tritici (Bjerk.) Wint. Die Pilze pag. 277, Tschroet. Pilz. Schles. p. 110, *Lycoperdon Tritici* Bjerk. in Act. Suec. 1775, p. 326, *Uredo Caries* DC. Fl. Franç. VI, p. 78.—*Cocoma segetum* Nees Syst. Pilze p. 14, t. I, f. 7.—*Uredo sitophila* Ditm. in Sturm D. C. Fl. p. 69, t. 34. Sacc. Syll. VII, p. 481.

Sur *Triticum vulgare*. Attique.

Classis ASCOMYCETAE

Fam. PERISPORIACEAE

PODOSPHAERA

Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary Syst. Ueb. Erys. in Hedw. 1871 p. 68.—*Alphitomorpha tridactyla* Wallr.—*Podosphaera Kunzei* Lév. in Ann. Sc. nat. Sur les feuilles d'*Armeniaca vulgaris* etc. Attique.

SPHAEROTHECA

Sphaerotheca Humuli (D.C.) Burr.—*Sphaerotheca Castagnei* Lév. in Ann. Scienc. nat. 1851, t. XV, p. 139, t. 6, f. 9 et 10.—*Erysiphe macularis*, *Dipsacearum*, *Potentillae fuliginea*, *ferruginea* etc. Auct., Sacc. Syll. I, p. 4.

Sur *Plantago major*, *Spiraea Ulmaria* etc. Attique.

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. Ann. Scienc. nat. 1851, XV, p. 138, t. 6, fig. 8.—*Alphitomorpha pannosa* Wallr. (1819), Sacc. Syll. I, p. 3.

Sur *Rosa centifolia*, etc. Attique.

PHYLACTINIA

Phylactinia suffulta (Rabh.) Sacc. Mich. II. p. 50.—*Ph. guttata* (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. 1851, t. XV, p. 144, t. 7, f. 11, Sacc. Syll. I, p. 5.

Sur les feuilles de *Lonicera Caprifolium*. Attique.

UNCINULA

Uncinula necator (Schw.) Burr.—*Uncinula spiralis*, Berk. et Curt.—*U. americana* E. C. Howe. F. conid. *Oidium Tuckeri* Berk.

Sur *Vitis vinifera*. Attique.

ERYSIPHE

Erysiphe Cichoracearum DC.—*E. lamprocarpa* (Wallr.) Lev. in Ann. Sc.

nat. 1851, XV, p. 163, t. 10, f. 31. — *Alphitomorpha lamprocarpa* Wallr. Sacc. Syll. I, p. 16.

Sur les feuilles de *Cucurbita*, *Taraxacum*, *Cichorium* etc. Attique.

Erysiphe graminis DC. Flor. Franc. VI, p. 106, Sacc. Syll. I, p. 19.

Sur les feuilles de *Hordeum vulgare*, *H. murinum*, *Poa*, *Avena* etc. Attique.

Erysiphe Polygoni DC. — *Erysiphe communis* (Wallr.) Fr. Summ. Ueg. Scand. p. 406 pr. p. — *Alphitomorpha communis* Wallr. Sacc. Syll. I, p. 18.

Sur les feuilles de *Polygonum aviculare*, *Pisum sativum*, *Convolvulus arvensis* etc. Attique.

Erysiphe Galeopsidis D.C. f. f. 108. De Bary Syst. Ueb. d. Erys. in Hedw. 1871, p. 68, Sacc. Syll. I, p. 16.

Sur *Marubium vulgare* et *Lamium amplexicaule*. Attique, près de Maroussi et Kiphissia.

LIMACINIA

Limacinia Penzigi Sacc. Syll. XIV, p. 474. — *Meliola Penzigi* Sacc. (1822). — *M. Camelliae* (Catt.) Sacc. — *Capnodium Citri* Penz.

Sur *Citrus Limonium*. etc. Attique.

CAPNODIUM

Capnodium Nerii Rabh. Fungi Eur. n. 662. Hedw. 1864, p. 73, Sacc. Syll. I, p. 77.

Sur *Nerium Oleander*. Attique.

Capnodium Footii Berk. et Desm., Moulds ref. — *Fumago* p. 13, fig. 10 — *Microxyphium Footii* Harw., Comes Cr. agr. p. 271., Sacc. Syll. I, p. 80.

Sur *Ficus carica*. Attique, près de Kiphissia.

Capnodium Rhamni CKl. — Sacc. Syll. IX, p. 439.

Sur *Rhamnus Alaternus*. Attique.

Capnodium Lentisci Thüm. — Sacc. Syll. I, p. 80.

Sur *Pistacia Lentiscus*. Attique.

Capnodium ilicinum Thüm. in Mycotheca universali n. 1846., Sacc. Syll. I, p. 78.

Sur les feuilles de *Quercus Ilex*. Attique, près d'Athènes.

ANTENNARIA

Antennaria elaeophila Mont. Syll. Crypt. n. 1067 et Bullet. Soc. centr. d'Agric. Paris, 2, ser., IV, p. 767 et Ann., 3, XII, 304, Sacc. Syll. I, p. 81.

Sur *Olea europaea*. Attique.

- Antennaria pithyophila** Nees. Fr. S. Myc. III. 231, Sacc. Gen. Pyr. it. 17.
 — *Antenaria pinophila* Fr. — *Torula fuliginosa* Let., Sacc. Syll. I, p. 80.
 Sur *Abies cephalonica*. Attique, Parnès.

Fam. SPHAERIACEAE

SPHAERELLA

- Sphaerella Fragariae** (Tul.) Sacc. Syll. XVI, p. 505. — *Stigmathea Fragariae* Tul. — *Ramularia Tulasnei* Sacc.

Sur *Fragaria vesca*. Attique, près de Kiphissia.

- Sphaerella Smilacina** Ell. et Ev.

Sur *Smilax aspera*. Attique.

- Sphaerella Hesperidum** Penz et Sacc., Sacc. Syll. IX, p. 630.

Sur *Citrus Limonium*. Attique près de Sepolia.

- Sphaerella Manganottiana** Massal.

Sur *Vitis vinifera*. Attique.

DIDYMOSPHAERIA

- Didymosphaeria brunneola**. Niessel Neue Kernp. p. 201, Sacc. Syll. I, p. 709.

Sur les tiges de *Verbascum sinuatum*. Attique, près de Sepolia.

SPHAERULINA

- Sphaerulina Poterii**, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis superficialibus, sphaeroideis, poro pertusis; ascis caespitosis, cylindraceis, octosporis, 100-110 × 8-10; sporidiis hyalinis, elongato-fuscideis, 3-septatis, 18-22 × 7-8.

Sur les tiges desséchées de *Poterium spinosum*. Attique, près de Villia.

LEPTOSPHAERIA

- Leptosphaeria Sibtorpii**, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis gregariis, epidermide tectis, dein erumpentibus, ostiolatis, depresso-globosis, nigris, 200-240 μ. diam. ascis cylindricis, octosporis, 60-65; sporidiis oblique distichis, oblongo-fusiformibus, triseptatis, ad septa constrictis, olivaceis, 14-16 × 4-5.

Sur les tiges desséchées d'*Euphorbia Sibthorpii*. Attique, près de Villia.

- Leptosphaeria Ballotae**, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis globosis, nigris, epidermide initio tectis dein erumpentibus, ostiolo pertusis; ascis cylindricis v. subclavatis, breviter pedicelatis, octosporis,

90-100 \times 18-20; sporidiis distichis oblongis, utrinque rotundatis, 5-septatis, ad septa constrictis, hyalino flavidis, 26-28; \times 7-8; paraphysibus filiformibus.

Sur les tiges desséchées de *Ballota acetabulosa*. Attique, près de Villia.

PLEOSPORA

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.—Sacc. Syll., II, p. 247.

Sur les feuilles desséchées de *Citrus Limonium* et sur les tiges desséchées de *Vicia Faba*. Attique.

Pleospora Asphodeli Rab.—Sacc. Syll., II, p. 266.

Sur *Asphodelus microcarpus*. Attique.

Pleospora collatina Sacc. et Spec.

Sur *Smilax aspera*. Attique.

Pleospora vulgaris Niessl.—Sacc. Syll., II, p. 243.

Sur les tiges desséchées de plantes différentes. Attique.

Pleospora Philadelphi, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, primum in cortice sub epidermide infossis, dein prominulis, globosis, nigris, ostiolo minuto, 140-160 μ . diam.; ascis clavatis, breve stipitatis, octosporis; Sporidiis distichis, oblongo-ovoideis, transverse 4-septatis, ad septum medium validiis constrictis, longitudinaliter 1-2 septatis, melleis dein atro-fuscis, 16-22 \times 8-10.

Sur les branches desséchées de *Philadelphus coronarius*. Attique, Kiphissia.

Pleospora Ligustri, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, epidermide tectis, dein estiolo erumpentibus, subglobosis, atris, 180-220 μ . diam.; ascis cylindraceo-clavatis, breve stipitatis, octosporis, 70-90 \times 14-16; sporidiis plerumque oblique distichis v. monostichis, ellipsoideo-subovatis, transverse 3-septatis v. 4-septatis, longitudinaliter 1-2-septatis, ad septa constrictis, flavis dein brunneis, 20-26 \times 9-11.

Sur les branches desséchées de *Ligustrum japonicum*. Attique, Kiphissia.

Pleospora Hederae, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, erumpenti-superficialibus, atris, membranaceis, subglobosis, ostiolis minutis; ascis clavatis, breve stipitatis, octosporis, 90-110 \times 10-12; sporidiis monostichis, ovoideis, tranverse 4-septatis, ad septa constrictis, loculis mediis in longitudine 1-septatis, 15-19 \times 7-9 melleis demum umbrinis, guttulatis.

Sur les tiges desséchées de *Hedera Helix*. Attique, près de Kiphissia.

Pleospora Meliae, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis gregariis v. sparsis, primo epidermide tectis dein suberumpenti-

bus, globosis, atro-fuscis, membranaceis, distincte ostiolatis; ascis clavatis, breve pedicellatis, octosporis, 100-110 \times 9-11; sporidiis plerumque monostichis, oblongo-ovoideis, utrinque rotundatis, muriformibus, septis transversis 6, primo flavescens, dein fuligineis 24-30 \times 11-12.

Sur les branches desséchées de *Melia Azedarach*. Attique, près de Kiphissia.

THEICHOSPORA

Theichospora Genistae, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis sparsis, superficialibus, globulosis, nigris, ostiolo papillato, perforato; ascis cylindraceis, breve stipitatis, octosporis, 130-140 \times 9-10; sporidiis ellipsoideis 5-7 transverse septatis, longitudinaliter 2-3 septatis, flavo-melleis, 20-22 \times 8-10; paraphysibus filiformibus, hyalinis.

Sur les tiges desséchées de *Genista Acantoclada*. Attique, près de Villia.

ROSELLINIA

Rosellinia necatrix (R. Hartig) Berlese.

Sur *Vitis vinifera*. Attique.

Fam. CERATOSTOMATACEAE

OPHIOBOLUS

Ophiobolus Phlomidis, J. Politis, nov. spec.

Peritheciis gregariis, primo epidermide tectis dein erumpentibus, atris, globosis ostiolatis; ascis clavato-cylindraceis, breviter cuneato-pedicellatis 120-140 \times 10-12, octosporis; sporidiis filiformibus, 20-24 septatis, ad septa paullum constructis, plus v. minus incurvatis, flavidulis, 90-100 \times 3, 5-4; paraphysibus filiformibus, hyalinis.

Sur les tiges desséchées de *Phlomis fruticosa*. Attique, près de Villia.

Fam. VALSACEAE

VALSA

Valsa Ceratophora Tul. Sel. Fung. Carp. II, p. 191, tab. XXII, fig. 1-11.

— *Sphaeria decorticans* Fr., Srcc. Syll. I, p. 108.

Sur *Quercus coccifera*. Attique.

Valsa Rubi Fuck. Symb. myc. p. 200, Peck. 28 Rep., Sacc. Syll. I, p. 109.

Sur *Rubus fruticosus*. Attique.

DIAPORTHE

Diaporthe neapolitana Sacc.

Sur *Mesembryanthemum acinacifolium*. Attique, près de Patissia.

Fam. HYPOCREACEAE

NECTRIELLA

Nectriella miltina (Mont.) Sacc.—Sacc. Syll. II, p. 448.

Sur *Agave americana*. Attique, près de Patissia.

Fam. EXOASCACEAE

EXOASCUS

Exoascus deformans (Berk.) Fuck., Sacc. Syll. VIII, p. 816.

Sur les feuilles d'*Amygdalus communis* et *A. Persica*. Attique, dans les jardins.

Classis PHYCOMYCETAE

Fam. MUCORACEAE

MUCOR

Mucor Mucedo Linn. Spec. Plant. II, 1655.—*M. Sphaerocephalus* Bull. t. 480, f. 2, Sacc. Syll. VII, p. 191.

Saprophyte extrêmement commun. Attique.

Fam. CYSTOPODACEAE

CYSTOPUS

Cystopus Bliti (Biv.) De Bary in Ann. Scienc. Nat. 1863. Ser. 4, tab. XX, p. 121.—*Uredo Bliti* Bivon. Bernardi Stirp. sicul. III, 11 Sacc. Syll. VII, p. 236.

Sur les feuilles d'*Amarantus Blitum*. Attique, près de Kiphissia.

Cystopus candidus (Pers.) Lév. in Ann. Scienc. Nat. Ser. 3, 1847, t. VIII, p. 371.—*Uredo candida* Persoon. Syn. Fung. 283.—*Caeoma candidum* Schlecht. Flor. Ber. II, p. 117, Sac. Syll. VII, p. 234.

Sur les feuilles de *Raphanus sativus*, *Sisymbrium officinale*, *Capsella Bursa-Pastoris*. Attique.

Cystopus Portulacae (DC.) Lév. Ann. S. Nat. 1847, p. 371, De Bary Rech. sur le dev. in Ann. Sc. Nat. 1863 Sér. 4, t. XX, p. 131, pl. III, f. 1-14.—*Uredo*

Portulacae DC. Fl. Franc. II.—*Erysibe quadrata* Wallr. Fl. Crypt. Germ., Sacc. Syll. VII, p. 235.

Sur les feuilles de *Portulaca oleracea*. Attique, près de Sepolia.

Fam. PERONOSPORACEAE

BREMIA

Bremia Lactucae Regel Bot. Zeit. 1843, St. 39, tab. III.—*Peronospora gangliiformis* (Berk.) De Bary Rech. sur le dév. in Ann. scienc. nat. 1863, 4 sér. XX, p. 108.—*Botrytis ganglioniformis* Tul. Compt. rend. XXXVIII, 26 m. Jun. 1854, Sacc. Syll. VII, p. 244.

Sur les feuilles de *L. sativa* et *Sonchus oleraceus*. Attique, près de Sepolia.

PLASMOPARA

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et De Ton.—*Peronospora viticola* (Berk. et Curt.) De Bary sur le dev. in Ann. Sc. Nat. 1863, ser. 4, t. XX, p. 125.—*Botrytis viticola* B. et C. apud Caspary Monats. Berl. Acad. 1855., Sacc. Syll. VII, p. 239.

Sur *Vitis Vinifera*. Attique.

PERONOSPORA

Peronospora arborescens (Berk.) De Bary in Rech. sur le dév. Ann. Sc. Nat. 1863, sér. 4, t. XX, p. 119.—*Botrytis arborescens* Berk. Jour. Hort. Soc. I, p. 31, t. 4, f. 24.—*Peronospora Papaveris* Tul. Compt. rend. l. c.—*P. grisea b. minor* Caspary in Rabenh. Herb. Myc. ed. 2, n. 323, Sacc. Syll. VII, p. 251.

Sur les feuilles de *Papaver somniferum*. Attique.

Peronospora effusa (Grev.) Rabenh. Herb. Myc. 1880.—*Botrytis effusa* Grev. Fl. Edin. p. 468.—*Botrytis farinosa* Fr. Syst. Myc.—*Peronospora Chenopodii* Schlecht. Bot. Zeit. 1852, p. 619.—*P. Chenopodii* Casp. Bot. Zeit. 1854, p. 565, Sacc. Syll. VII, p. 256.

Sur les feuilles de *Chenopodium murale*. Attique, près de Kiphissia.

Peronospora trifoliorum De Bary Rech. sur le Dév. in Ann. Sc. Nat. 1863, Ser. 4, t. XX, p. 117, Hedw. 1864, n. 9 p. 137.—*P. grisea* var. Caspary in Rabenh. Herb. Myc. ed. II, n. 775 Fung. Eur. n. 375, Fuck. Fung. Rhen. n. 9, Sacc. Syll. VII, p. 252.

Sur les feuilles de *Medicago sativa*, *Trifolium arvensis* et *T. Repens*. Attique.

Peronospora Alsinearum Casp. in Berl. Acad. d. Wissensch. 1855, De Bary in Hedwigia 1864, n. 9, p. 135.—*P. Scleranthi* Rab. in Herb. Myc. I, p. 1471 b.

— *P. conferta* Ung. Bot. Zeit. 1847, p. 314 — *P. tomentosa* Fuck. Fung. Rhen., Sacc. Syll. VII, p. 252.

Sur les feuilles de *Stellaria media*. Attique, près d'Athènes.

Peronospora Urticae (Lib.) De Bary Rech. sur le dév. in Ann. Sc. Nat. 1863, sér. 4, t. XX, 116. — *Botrytis Urticae* Libert. mscrp. apud. Berk. Journ. Hort. Sac. Lond. I, p. 31, Berk et Broome Notices on Brit. Fungi in Ann. Mag. Nat. hist. sér. 2, vol. VII.

Sur les feuilles d'*Urtica urens*. Attique, près de Moschaton.

Peronospora Schleideni Ung. Bot. Zeit. 1847, p. 315. — *Peronospora destructor* Caspary, Berkeley Outl. p. 349. — *P. Alliorum* Fuck. Symb. Myc. p. 71. — *Botrytis destructor* Berk. Ann. N. H. n. 239, t. 13, f. 23, Sacc. Syll. VII, p. 257.

Sur *Allium Cepa*. Attique, près de Moschaton.

Peronospora Myosotidis De Bary Rech. sur le dev. in Ann. Sc. Nat. 1863, sér. 4, t. XX, p. 112, Rabenh. Fung. Eur. n. 252, Sacc. Syll. VII, p. 245.

Sur les feuilles de *Lithospermum arvense*. Attique.

Peronospora Schachtii Fuck. Symb. Myc. p. 71, Sacc. Syll. VII, p. 245.

Sur les feuilles de *Beta vulgaris*. Attique, près de Kolokithou.

Peronospora parasitica (Pers.) De Bary Rech. sur le dév. in Ann. Scienc. Nat. 1863, Sér. 4, t. XX, p. 110. — *Botrytis parasitica*, Pers' Obs. I, p. 96, t. 5, f. 6, Corda Icon. V, p. 52, t. II, f. 18. — *B. ramulosa* Link Spec. I, p. 53, Sacc. Syll. VII, p. 249.

Sur les feuilles de *Brassica oleracea*, *Cheiranthus Cherii*, *Raphanus sativus* et *Capsella Bursa-pastoris*. Attique aux environs d'Athènes.

Peronospora Viciae (Berk.) De Bary Rech. sur le dév. in Ann. Sc. Nat. 1863, 4 sér. t. XX, p. 112, Hedw. 1864, n. 9, p. 135. — *Botrytis Viciae* Berk. Journ. Hort. Soc. I, 31. — *Peronospora effusa* var. *intermedia* Caspary in Robench. Herb. Myc. ed. II, n. 490, Sacc. Syll., VII, p. 245.

Sur les feuilles de *Vicia Faba*. Attique, près de Sépolia.

PHYTOPHTORA

Phytophthora infestans (Mont.) De Bary Research. nat. pot. fung. in Journ. Agric. Soc. Ser. II, Vol. XII, p. I, n. 23, 1876 et in Journ. Bot. 1876, p. 105-126, 149-154. — *Peronospora infestans* De Bary sur le dév. in Ann. Scienc. Nat. 1863, sér. 4, tab. XX, p. 104, Sacc. Syll., VII, p. 237.

Sur *Solanum tuberosum*. Attique.

Subdiv. DEUTEROMYCETAE

Fam. SPHAERIOIDACEAE

PHYLLOSTICTA

Phyllosticta Persicae Sacc. Mich. I, p. 147, Sacc. Syll. III, p. 8.

Sur les feuilles de *Persica vulgaris*. Attique.

Phyllosticta prunicola (Opiz.) Sacc. Mich. I, p. 147, Sacc. Syll. III, p. 4.

Sur les feuilles de *Prunus domestica*, *Pr. Cerasus*. Attique.

Phyllosticta Amaryllidis, Bres.—Sacc. Syll. XIV, p. 864.

Sur *Amaryllis Reginae*. Attique, près d'Athènes.

Phyllosticta buxina Sacc. Mich. I, p. 137, Sacc. Syll. III, p. 24.

Sur les feuilles de *Buxus sempervirens*. Athènes.

Phyllosticta Syringae West. Not. II, 23, Kick. Flandr. I, 417, Sacc. Syll. III, p. 22.

Sur les feuilles de *Syringa vulgaris*. Athènes.

Phyllosticta Pittosporum, J. Polii, nov. spec.

Pycnidiis sparsis vel pauci-gregariis amphigenis v. hypophyllis, atris, subepidermicis dein erumpentibus globoso-depressis, 100-140 μ . diam., contextu parenchymatico, fuligineo, ostiolo latiusculo pertusis; sporulis bacilliformibus, 14-16 \times 2, 5-3.

Sur les feuilles de *Pittosporum chinense*. Attique, Kiphissia.

Phyllosticta Doronici, J. Politis, nov. spec.

Maculis epiphyllis, atrofuliginis, irregularibus, velangulosis, saepe confluentibus, peritheciis sparsis vel laxe gregariis minutis, hypodermicis, demum erumpentibus, atris globosis, majusculis 120-150 micr. diam., contextu parenchymatico; sporylis oblongo-cylindraceutis, utrinque rotundatis saepe curvulis, 6-8 \times 2 micr. crassis, hyalinis.

Sur les feuilles de *Doronicum Caucasicum*. Attique, Parnès.

Phyllosticta ampelophila, J. Politis, nov. spec.

Maculis irregularibus, parvulis, brunneis dein fuscis, sparsie vel confluentibus, peritheciis punctiformibus, nigris, epiphyllis vel amphigenis; sporulis minutis, hyolinis, breviter bacillaribus, 5-6 \times 1-1, 5 μ .

Sur les feuilles de *Vitis vinifera*. Attique, près d'Athènes.

PHOMA

Phoma errabunda Desm. Ann. Sc. Nat. 1849, p. 282, Sacc. Syll. III, p. 128.
Sur *Verbascum sinuatum*. Attique, près de Patissia.

Phoma viticola Sacc. et Speg. Mich. I, p. 153, Sacc. Syll. III, p. 19.
Sur *Vitis vinifera*. Attique.

Phoma herbarum West. Exs. 965, Mich. II, p. 92, Sacc. Syll. III, p. 133.
Sur *Urtica pilulifera*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma domestica Sacc. Mich. II, p. 90, Sacc. Syll. III, p. 81.
Sur *Jasminum*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Malvacearum Weit. Exs. n. 1232, Sacc. Syll. III, p. 122.
Sur *Malva silvestris*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma obtusa Fuck. Symb. p. 378, Sacc. Syll. III, p. 126.
Sur *Daucus Carota*. Attique.

Phoma cinerescens Sacc. Mich. I, p. 521, Sacc. Syll. III, p. 96.
Sur *Ficus Carica*. Attique, près de Villia.

Phoma Calycotomes Roll.
Sur *Calycotome villosa*. Attique, près de Villia.

Phoma pusilla Schulz. et Sacc. Micr. Slav. n. 48. Schulz. III, Fung. Slav.
n. 691, Sacc. Syll., III, p. 77.
Sur *Rosa canina*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma lirella Desm. Ann. Sc. nat. 1849, p. 281, Sacc. Syll. III, p. 139.
Sur *Vinca major*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Pycnocephali Passer.—Sacc. Syll. X, p. 168.
Sur *Carduus pycnocephalus*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Clematidis Sacc. Mich. II, p. 616, Sacc. Syll. III, p. 118.
Sur *Clematis cirrhosa*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Litoris Sacc.
Sur *Phragmites communis*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma vaginae Sacc. Mich. II, p. 617, Sacc. Syll. III, p. 165.
Sur *Phragmites communis*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Lentisci Pass.—Sacc. Syll. X, p. 169.
Sur *Pistacia Lentiscus*. Attique.

Phoma cylindrospora (Desm.) Sacc. Mich. I, p. 527, Sacc. Syll. III, p. 113.
Sur *Evonymus japonicus*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma ampelina B. et C. North. Amer. F. n. 380, Sacc. Syll. III, p. 79.
Sur *Vitis vinifera*. Attique, près de Villia.

Phoma Friesii Brun.—Sacc. Syll. X, p. 147.
Sur *Ligustrum japonicum*. Attique.

Phoma Gledischiae (Thüm.) Sacc.—*Coniothyrium Gleditsiae* Thüm. Symb.
Myc. Austr. I. n. 6, Sacc. Syll. III, p. 66.
Sur *Gledischia Triacanthus*. Attique, près d'Athènes.

Phoma superflua Sacc. Mich. I, p. 552, Sacc. Syll. III, p. 139.
Sur *Scabiosa maritima*. Attique.

Phoma Poterii - spinosi Sydow.
Sur *Poterium Spinosum*. Attique, près de Kiphissia.

Phoma Sophorae Sacc. Fung. Ven. Ser. V. p. 202; Syll. III, p. 67.
Sur *Sophora japonica*. Attique, près de Villia.

Phoma Acaciae Penzig et Sacc., Fung. Mortol. n. 23; Syll. III, p. 148.
Sur *Acacia cyanophylla*. Attique, près de Villia.

Phoma Pycnocephali Passer. Diagn. F. N. V. N° 28 Socc., Syll. X, p. 128.
Sur *Carduus pycnocephalus*. Attique, près de Villia.

Phoma Viticis Celotti Mir. Montpell. p. 15, Sacc. Syll. X, p. 155.
Sur *Vitex Agnus-castus*. Attique, près de Villia.

Phoma Urticae Schultz. et Sacc. Syll. III, p. 140; Schulz., Illust. Fung.
Slav. N° 700.
Sur *Urtica dioica*. Attique, près de Villia.

Phoma herbarum Westend.
Sur *Chrysanthemum*, *Foenicullum*, *Dahlia*, *Lactuca* etc. Attique.

Phoma Ceratoniae, J. Politis, nov. spec.
Phycnidiis gregariis, minutis, nigris, epidermide tectis dein erumpentibus, subglobosis, contextu minute parenchymatico; sporulis ovoideis, continuis, hyalinis, 7, 5-8 × 3, 5-4; sporophoris brevibus.
Sur les branches desséchées de *Ceratonia Siliqua*. Attique près de Maroussi.

Phoma Thapsiae J. Politis, nov. spec.
Peritheciis sphaericis, nigris, epidermide velatis erumpentibusque, contextu

parenchymatico, 80-100 diam.; sporulis cylindraceis, hyalinis, continuis 4-5 \times 1; sterigmatibus brevibus hyalinis.

Sur les tiges desséchées de *Thapsia Garganica*. Attique, près de Kiphissia.

Macrophoma rimiseda (Sacc.) Berl. et Wogl.—Sacc. Syll., X, p. 200.

Sur *Vitis vinifera*. Attique, près de Kiphissia.

Macrophoma Lepidii, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis primo tectis, demum erumpentibus, sparsis, globulosis, atris, ostiolo minuto rotundo pertusis; contextu parenchymatico, 160-200 μ . diam.; sporulis fusiformibus, intus-minute granulosus, continuis 16-20 \times 7-8; sporophoris filiformibus, brevibus, hyalinis.

Sur les tiges desséchées de *Lepidium sativum*. Attique, près de Kiphissia.

Macrophoma Juncei Passer.—Sacc. Syll. P, p. 190.

Sur *Spartium junceum*. Attique près de Villia.

Macrophoma Dalmatica (Thüm.) Berl. et Vogl.—Sacc. Syll. X, p. 203.

Sur *Olea europaea*. Attique près de Villia.

ASTEROMA

Asteroma Muscari, J. Politis, nov. spec.

Maculis expansis cauliculis, primum pallide brunneis, dein obscure brunneis, demum nigris, fibrillis delicatissimis, fuscis, parallelis; pycnidiis gregariis, minutis, atris.

Sur les tiges desséchées de *Leopoldia comosa* (syn. *Muscari comosum*). Attique, près de Villia.

VERMICULARIA

Vermicularia Dematium (Pers.) Fries.—Sacc. Syll. III, p. 255.

Sur *Solanum Lycopersicum*. Attique près de Villia.

CYTOSPORELLA

Cytosporaella sycina Sacc.—Sacc. Syll. III, p. 251.

Sur *Ficus carica*. Attique, près de Villia.

CYTOSPORA

Cytospora punica Sacc. Mich. I, p. 368.—*Valsae punicae* spermog. Cfr. Syll. I, p. 130, Fung. It. 403, Sacc. Syll. III, p. 256.

Sur *Punica Granatum*. Attique, près de Villia.

Cytospora Rosarum Grev. in Bail. Syst. d. Pilz. p. 81, t. 14. Sacc. Syll. III, p. 253.

Sur branches desséchées de *Rosa Banksiana*. Attique, près de Kiphissia.

Cytospora Ailanthi B. et C. North Amer. F. p. 88, Sacc. Syll. III, p. 277.

Sur branches desséchées d'*Ailanthus glandulosa*. Attique, près de Kiphissia.

Cytospora clypeata Sacc. — *Valsellae clypeatae* st. sperm. Fuck. Symb. App. I, p. 31, Sacc. Syll. III, p. 252.

Sur branches desséchées de *Rubus fruticosus*. Attique, près de Kiphissia.

Cytospora microspora (Corda) Rabenh. Deutsch. Crypt. Fl. p. 147. — *Nae-maspora microspora* Corda III, p. 26, fig. 69, Sacc. Syll. III, p. 253.

Sur branches desséchées de *Cydonia vulgaris*. Attique, près de Villia.

Cytospora syconophilum Schulz. et Sacc.

Sur branches desséchées de *Ficus carica*. Attique, près de Villia.

Cytospora pusilla Schulz. et Sacc.

Sur les tiges desséchées de *Rosa canina*. Attique, près de Villia.

Cytospora rubescens Fr.

Sur *Prunus armenica*. Attique, près de Villia.

Cytospora Vitis Mont. Syll. Crypt. n. 925. — *Valsa vitis* st. sperp. Nits. Pyr. Germ. p. 190, Sacc. Syll. III, p. 256.

Sur *Vitis vinifera*. Attique, près de Villia.

Cytospora cineta Sacc. Subsp. *amygdalina*.

Sur branches desséchées d'*Amygdalus communis*, v. *amara*. Attique, près de Villia.

Cytospora Nerii, J. Politis, nov. spec.

Stromatibus gregariis, subcutaneo-erumpentibus, conoideis plurilocularibus, loculis plus minusque radiatim ordinatis; sporulis copiosis cylindraceis, curvulis, allantoideis, hyalinis, 4×1 ; sporophoris filiformibus, simplicibus usque ad 20 μ . long.

Sur les tiges desséchées de *Nerium Oleander*. Attique, près de Kiphissia.

Cytospora Euphorbiae, J. Politis, nov. spec.

Stromatibus subcutaneis; minutis, atris, conicis, dein vix erumpentibus, intus uni-v. paucilocularibus; sporulis allantoideis, curvulis, $7-9 \times 1, 5-2$; sporophoris ramosis.

Sur les tiges desséchées de *Euphorbia Sibthorpii*. Attique, près de Villia.

Cytospora Calycotomes, J. Politis, nov. spec.

Stromatibus subcutaneo-erumpentibus, subglobosis, intus paucilocularibus; loculis irregulariter dispositis; sporulis cylindricis, curvis, 6-7, 5 \times 1, 5 hyalinis; sporophoris ramosis, hyalinis.

Sur les tiges desséchées de *Calycotome villosa*. Attique, près de Villia.

CONIOTHYRIUM

Coniothyrium incrustans Sacc. Fungi Ven. novi vel. crit. Ser. IV, p. 14, Sacc. Syll. III, p. 313.

Sur *Broussonetia papyrifera*. Attique, près d'Athènes.

Coniothyrium Fuckelii Sacc. Fungi Ven. novi sel critici, Ser. V, p. 200, Mich. I, p. 207.

Sur *Ampelopsis quinquefolia*. Attique, près de Kiphissia.

Coniothyrium Ligustri W.—Sacc. Syll. XI, p. 515.

Sur branches de *Ligustrum japonicum*. Attique, près d'Athènes.

Coniothyrium caespitosum Sacc. Mich. I, p. 206, Sacc. Syll. III, p. 311.

Sur branches de *Tamarix*. Attique près de Kiphissia.

Coniothyrium Pittospori, J. Politis, nov. spec.

Picnidiis sparsis, subglobosis, atro-fuscis; sporulis globosis, continuis, atro-brunneis, 6-7 μ . diam.

Sur les tiges desséchées de *Pitosporum sinensis*. Attique.

Coniothyrium Amygdali, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis dense gregariis innato-erumpentibus, nigris, globosis, 90-130 μ . diam. contextu parenchymatico; sporulis ellipsoideis utrinque obdusis, castaneis, 9-11 \times 5-6.

Sur branches desséchées de *Amygdalus communis*. Attique, près de Villia.

HAPLOSPORELLA

Haplosporella juglandina Sacc. et Sydow.

Sur branches desséchées de *Juglans regia*. Attique, près de Villia.

MICRODIPLODIA

Microdiplodia hedericola Sacc.

Sur *Hedera Helix*. Attique, près de Kiphissia.

Microdiplodia Evonymi J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis epidermide tectis, sparsis vel gregariis erumpentibus, subglobosis, minutis, apice ostiolo minuto papilato, contextu parenchymatico, fusco-nigris; sporulis ellipsoideis, 6-8 \times 3-4, utrinque rotundatis, medio transverse uniseptatis ubique non v. vix constrictis, flavido brunneis.

Sur tiges desséchées d'*Evonymus japonicus*. Attique, Kiphissia.

Microdiplodia Fici, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis gregariis, primum epidermide tectis deinde erumpentibus, lenticularibus, atris, apice perforatis, contextu parenchymatico; sporulis ovoideis, uniseptatis ubique non constrictis, brunneis. 6-7 \times 3.

Sur branches desséchées de *Ficus Carica*. Attique, près de Villia.

Microdiplodia Eriobotryae, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis laxae gregariis, globulosis, erumpentibus, nigris, pertusis; sporulis ellipsoideis vel ovoideis, primo continuis, tandem uniseptatis, ad septum non constrictis, olivaceis 8-10 \times 3.

Sur branches desséchées d'*Eriobotrya japonica*. Attique, près de Kiphissia.

DIPLODIA

Diplodia macrostoma Lév. Ann. Sc. nat. 1846, p. 211, Sacc. Syll. III, p. 350.

Sur branches desséchées de *Ficus carica*. Attique, près de Villia.

Diplodia profusa De Not. Micr. Ital. Dec. IV, n. 8, Sacc. Syll. III, p. 336.

Sur branches desséchées de *Robinia Pseudacacia*. Attique, près de Villia.

Diplodia laurina Sacc. M. v. n. 508. F. Ven. Ser. V, n. 370.—*Dipl. melaena* var. *Lauri*, Roum. F. Gall. n. 121, Sacc. Syll. III, p. 348.

Sur branches desséchées de *Laurus nobilis*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia sparsa Fuck. Symb. myc. p. 395, Sacc. Syll. III, p. 368.

Sur branches desséchées de *Spiraea*. Attique, près d'Athènes.

Diplodia rosarum F. Summa Veg. p. 417.—*D. Rosae*, West. Not. VI, p. 21, Kicc. Fl. Crypt. I, p. 395, Sacc. Syll. III, p. 338.

Sur branches desséchées de *Rosa centifolia*. Attique, dans les jardins.

Diplodia Juglandis Fr. Summa Veg. Sc. p. 417.—*Sphaeria Juglandis*, Fr. S. M. II, p. 493, Sacc. Syll. III, p. 352.

Sur branches desséchées de *Juglans regia*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Hederae Fuck. Symb. myc. p. 394, t. II, f. 35, Sacc. Syll. III, p. 344.

Sur *Hedera Helix*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Sophorae Speg. et Sacc. Mich. I, p. 485 et II, p. 268, Sacc. Syll. III, p. 335.

Sur branches desséchées de *Sophora japonica*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia ramulicula Desm. Ann. Sc. nat. 1850, p. 113. — *D. Evonymi*, Fuck. nec West., Sacc. Syll. III, p. 333.

Sur branches desséchées de *Evonymus japonicus*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Pruni Fuck. Symb. p. 169, Sacc. Syll. III, p. 339 et X, 277.

Sur branches desséchées de *Prunus Armeniaca*. Attique, près de Maroussi et Kiphissia.

Diplodia Pistaciae Berl et Bres. — Sacc. Syll. X, p. 282.

Sur branches dechessées de *Pistacia Lentiscus*. Attique.

Diplodia Eriobotryae Sacc. Mich. II, p. 267, Sacc. Syll. III, p. 326.

Sur branches desséchées de *Eriobotrya japonica*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Siliquastri West. Bull. Soc. Belg. II, p. 244 (1864). Passer. F. Parm. in Comm. Crit. II, p. 438 (1867).

Sur branches desséchées de *Cercis Siliquastrum*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Amygdali Cooke et Hark. in Grevillea n. 64, Sacc. Syll. III, p. 341.

Sur branches desséchées d'*Amygdalus communis*. Attique.

Diplodia Oleae Pegl. — Sacc. Syll. XI, p. 250.

Sur branches desséchées d'*Acer Negundo*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Cerasorum Fuck. Symb. myc. p. 154, Mich. II, p. 270, Sacc. Syll. III, p. 341.

Sur branches desséchées de *Cerasus avium*. Attique.

Diplodia Rosmarini Cel. — Sacc. Syll. X, p. 281.

Sur *Rosmarinus officinalis*. Attique, près de Villia.

Diplodia Rubi Fr. Summa Veg. Scand. p. 417, Sacc. Syll. III, p. 339.

Sur *Rubus fruticosus*. Attique près de Kiphissia.

Diplodia clandestina Dur et Mont. Fl. Alg. p. 575 et Syll. Crypt., n. 953, Sacc. Syll. III, p. 393.

Sur branches desséchées de *Rhamnus Alaternus*. Attique.

Diplodia Lilacis West. — Sacc. Syll. III, p. 346.

Sur branches desséchées de *Syringa vulgaris*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia viticola Desm. Ann. Sc. nat. 1838, p. 311, Sacc. Syll. III, p. 332.
Sur branches desséchées de *Vitis vinifera*. Attique, près de Villia.

Diplodia vincaecola Brun.—Sacc. Syll. X, p. 285.
Sur *Vinca major*. Attique, près de Kiphissia et Villia.

Diplodia Mori West. Bull. Soc. bot. Belg. II, p. 244.—*Sphiria Mori*, Chaill.
in Fr. S. Myc. II, p. 494, Sacc. Syll. p. 351.

Sur les branches desséchées de *Morus alba*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Plumbaginis, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis v. laxe gregariis, epidermide tectis, erumpentibus, globoso-depressis, apice ostiolo perforatis; sporulis ellipsoideis v. ovoideis, utrinque obtusis, atro-brunneis, uniseptatis, 12-15 × 6-8.

Sur les tiges desséchées de *Plumbago europea*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodia Stachydis, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis, sparsis epidermide tectis, erumpentibus, globoso-depressis, nigris, apice ostiolo minuto perforatis; sporulis ovato-ellipsoideis, utrinque rotundatis, bruneis, uniseptatis, ad septum leviter constrictis, 17-19 × 7-8; Sporophoris hyalinis, brevibus.

Sur tiges desséchées de *Stachys cretica*. Attique, près de Villia.

Diplodia Poterii, J. Politis, nov. spec.

Picnidiis gregariis, subcutaneo-erumpentibus, globosis nigris; sporulis ovoideis, brunneis, medio transverse uniseptatis, non v. vix constrictis, 15-16 × 6-7; Sporophoris hyalinis, 16-18 μ. longis.

Sur les tiges desséchées de *Poterium spinosum*. Attique, près de Villia.

Diplodia Ceratoniae, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis, minutis dense gregariis, erumpentibus, nigris, subglobosis, poro pertusis; sporulis ellipsoideis, utrinque rotundatis, primo continuis hyalinis, dein medio, 1-septatis brunneis, constrictis, 16-17 × 8-9; Sporophoris hvalinis, brevibus.

Sur branches desséchées de *Ceratonia Siliqua*. Attique, près de Maroussi.

BOTRYODIPLODIA

Botryodiplodia atra Berl et Bresad., Sacc. Syll. III, p. 354.

Sur branches desséchées de *Pistacia Terebinthus*. Attique, près de Kiphissia.

ASCOCHTA

Ascochyta Hesperidearum Penz Fung. Agr. n. 81, fig. 1184.

Sur les feuilles desséchées de *Citrus Limonium*. Eleussis.

Ascochyta Pisi Lib. Exc. n. 12.—*Sphaeria* (Depazea) *concava*, Berk. Ann. N. H. n. 194, t. XI, f. 3.—*Zythia rabiei*, Pass.—*Septoria Leguminis, Pisi Kicky, Acrospora Pisi*, Fuck. Sacc. Syll. III, p. 397.

Sur *Pisum sativum* Attique.

DIPLODINA

Diplodina Smilacis Ell. et Ev.

Sur *Smilax aspera*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodina Rosae P. Brun.

Sur *Rosa centifolia*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodina berberina Sacc.

Sur *Berberis*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodina Calaminthae, J. Politis, nov. spec.

Picnidiis subepidermicis, sparsis, globoso-depressis, fuscis poro pertusis 120-180 μ . diam.; sporulis ovoideis v. ellipsoideis, maturis uniseptatis, ibique non constrictis, hyalinis, 8-9 \times 3-4.

Sur tiges desséchées de *Calamintha Acinos*. Attique, près de Kiphissia.

Diplodina Vincae, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis epidermide textis, sparsis, obscure brunneis, v. nigris, contextu parenchymatico obscure brunneo, sporulis ellipsoideis, uniseptatis, non constrictis, 10-12 \times 4-5.

Sur tiges desséchées de *Vinca major*. Attique, près de Kiphissia.

HENDERSONIA

Hendersonia sarmentorum West. Bull. de Brux. XVIII, n. 60, f. 2, Sacc. Syll. III, p. 420.

Sur branches desséchées de *Laurus nobilis*. Attique, près de Villia.

Hendersonia obscura Passer.—Sacc. Syll. X, p. 319.

Sur branches desséchées de *Robinia Pseudacacia*. Attique, près de Kiphissia.

Hendersonia arundinacea (Desm.) Sacc., Mich. I, p. 211.—*Sphaeria arundinacea*, Desm. Obser. sur le *Sph. arund.* et Godini 1846, p. 46, Sacc., Syll., III, p. 436.

Sur *Phragmites communis*. Attique, près de Kiphissia.

Hendersonia Rubi West.—Sacc., Syll., III, p. 424.

Sur *Rubus fruticosus*. Attique, près de Kiphissia.

Hendersonia Desmazieri Mont. Cent. VI, n. 92, l. c. XII, p. 310 (1848-9).

—*Stagonosporium Platani*, Preuss (1853).—*Hendersonia Platani*, Peck. Sacc. Syll. III, p. 440.

Sur branches de *Platanus orientalis*. Attique, près de Kiphissia.

Hendersonia Amygdali, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis gregariis, globoso-depressis, primo tectis, dein erumpentibus, nigris, poro pertusis, contextu parenchymatico; sporulis numerosissimis, ovoideo-oblongis, plerumque ellipsoideis. utrinque rotundatis, eguttulatis, obscure brunneis, 3-septatis, non v. vix constructis, 16-18 × 5-6.

Sur branches desséchées de *Amygdalus communis*. Attique, près de Villia.

Hendersonia Arbuti, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis vel gregariis, minutis, punctiformibus, primo tectis, nigris, apice ostiolo conico perforatis, contextu parenchymatico; sporulis fusioideis, utrinque acutiusculis, triseptatis, brunneis, 12-16 × 6-8.

Sur branches desséchées de *Arbutus Unedo*. Attique, près de Kiphissia.

Hendersonia sarmentorum, var. *Poterii*, J. Politis, nov. var.

Pycnidiis sparsis vel gregariis, numerosis, nigris, depresso-globosis tectis, poro dehiscentibus; sporulis ellipsoideis vel subovatis, utrinque obdusis, brunneis, triseptatis, non constrictis 11-13 × 4¹/₂-5¹/₂.

Sur tiges desséchées de *Poterium spinosum*. Attique près de Villia.

CAMAROSPORIUM

Camarosporium Passerini Sacc. Syll. X, p. 344.

Sur branches desséchées de *Morus Alba*. Attique, près de Villia.

Camarosporium Oleae, J. Politis, nov. spec.

Pycnidiis sparsis v. hinc inde pauci-gregariis, primo tectis dein erumpentibus et leviter prominulis, subglobosis, atris, contextu parenchymatico, maturitate vertice dehiscentibus; sporulis oblongo-ellipsoideis, fuligineis 1-3 septatis, ad septa non constrictis, 9-12 × 4.

Sur branches desséchées de *Olea europea*. Attique, près de Kiphissia.

SEPTORIA

Septoria Pistacina Alescher (syn. *Dothidea Pistaciae* Léveillé).

Sur les feuilles de *Pistacia vera*. Attique.

Septoria Cercidis Fr. in Lév. Ann. Sc. nat. 1848, p. 251, Sacc. Syll. III, p. 484.

Sur les feuilles de *Cercis siliquastrum*. Attique.

Septoria Citri Pass. Flora 1877, n. 13 et in Thüm., Mycoth. univ. n. 495. Mich. II, p. 173 et 435, Sacc. Syll. III, p. 477.

Sur les feuilles de *Citrus Limonium*. Attique, près de Kolokithou.

Septoria Clematidis Rob. et Desm. in Ann. Scienc. Nat. 1853, XX, p. 93, Sacc., Syll., III, p. 524.

Sur les feuilles de *Clematis cirrhosa*. Attique, près de Kiphissia.

Septoria Convolvuli Desm. in Ann. Sc. nat. 1842, XVIII, p. 108.—*S. fuscella*, Berk. in Curr. Simpl. Sphaer. n. 396, Sacc. Syll. III, p. 536.

Sur les feuilles de *Convolvulus arvensis*. Attique, près de Kolokythou.

Septoria Coeleariae Cocc. et Mor. Enumer. Funghi prov. Balogna II, n. 176, f. II, Sacc. Syll. III, p. 560.

Sur les feuilles de *Koeleria phloeoidis*. Attique, près de Marousi Kiphissia, Ménidi.

Septoria Chenopodii West. in Bull. Ac. d. sc. Bruxelles 1851, p. 396, Sacc. Syll., III, p. 556.

Sur les feuilles de *Chenopodium murale*. Attique, près de Moschaton.

Septoria Ficariae Desm. Exs. n. 1087, Kickx Fl. Fland. I, p. 434, Sacc. Mich. II, p. 346, Sacc. Syll., III, p. 522.

Sur les feuilles de *Ficaria ranunculoides*. Attique, près de Koropi.

Septoria Petroselini Desm. Exc. n. 674, Kickx Fl. I, p. 424.—*Depazea Petroselini* Desm. Ann. Sc. nat. Bot. 1840, p. 10.

Sur les feuilles de *Petroselinum sativum* Attique.

Septoria piricola Desm. 18, Not. 7, p. 8.—*Septoria dealbata* Lév.—*S. Piri*, West. Exs. n. 136, Sacc., Syll. III, p. 487.

Sur les feuilles de *Pirus communis*. Attique.

Septoria Urticae Desm. et Rob. 14 Not. 1847, p. 24, Sacc. Syll. III, p. 487. Sur les feuilles d'*Urtica urens*. Attique, près d'Athènes.

Septoria Andrachnes, J. Politis, nov. spec.

Maculis amphigenis, irregularibus, brunneis, purpureo-marginatis; pycnidiis paucis, punctiformibus, nigris; sporulis filiformibus, curvulis, continuis guttulatis 30-40. \times I-I, 5.

Sur les feuilles d'*Arbutus Andrachne*. Attique, près d'Ékali.

PHLEOSPORA

Phleospora Mori (Lév.) Sacc.—*Septoria mori*, Lév. in Ann. Sc. nat. 1846, V. p. 279, Sacc. Mich. I, p. 175.—*Fusarium maculans*, Bereng. Atti Congr. Mil. 1844.—*Fusisporium Mori*, Mont. Bull. Soc. Agr. 1853, Sacc. Syll., III, p. 608.

Sur les feuilles de *Morus alba* et *M. nigra*. Attique.

RABDOSPORA

Rabdospora Brunaudiana Sacc. Mich. I, p. 528, Sacc. Syll., III, p. 590.

Sur les tiges desséchées de *Foeniculum capilaceum*. Attique, près de Maroussi.

Fam. MELANCONIACEAE

GLOEOSPORIUM

Gloeosporium Violae Berk et Br. Ann. N. H. n. 1703, Sacc. Syll. III, p. 701.
Sur les feuilles de *Viola odorata*. Attique.

Gloeosporium intermedium Sacc.—Sacc. Syll., XIV, p. 702.
Sur *Citrus nobilis*. Attique, près d'Athènes.

Gloeosporium Helicis (Desm.) Oud. Fungi Neerl. n. 196. Sacc. F. it. t. 1026.
—*Cheilaria Helicis* Desm. Ann. Sc. nat. 1847, p. 27, Sacc., Syll., III, p. 707.
Sur les feuilles d'*Hedera Helix*. Attique, près d'Athènes

Gloeosporium phomoides Sacc. Mich. II, p. 540, et F. it. t. 1060, Sacc. Syll. III, p. 718.

Sur les fruits de *Lycopersicum esculentum*. Attique.

Gloeosporium tineum Sacc. Mich. I, p. 219, F. ital. t. 1055, Sacc. Syll. III, p. 707.

Sur les feuilles de *Viburnum Tinus*. Attique, près de Kiphissia.

Gloeosporium Asphodeli, J. Politis, nov. spec.

Acervulis irregulariter sparsis, erumpentibus, lenticularibus; conidiis ellipsoideis, utrinque rotundis, continuis, hyalinis, guttulatis, 7-8 × 2, 5-3; conidiophoris simplicibus, continuis brevibus.

Sur les tiges desséchées d'*Asphodelus ramosus*. Attique, près d'Athènes.

Gloeosporium Urospermi, J. Politis, nov. spec.

Maculis exaridis, brunneis; acervulis laxae gregariis, atro-brunneis, lenticularibus erumpentibus; conidiis ovoideis v. subellipsoideis, continuis, hyalinis,

8-01 \approx 3,5-4; conidiophoris simplicibus, continuis, hyalinis, longe cylindraceis, 15-20 \approx 2-3.

Sur les feuilles d'*Urospermum picroides*. Attique, près de Koropi.

COLLETOTRICHUM

Colletotrichum Montemartinii Togn. Sacc. Syll. XI, p. 570.

Sur les feuilles d'*Arum Italicum*. Attique, près de Patissia.

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst.

Sur les fruits de *Cucumis Melo*.

Colletotrichum gloeosporioides Penz.

Sur *Citrus*. Attique.

Colletotrichum Lonicerae, J. Politis, nov. spec.

Acervulis epiphyllis, sparsis, erumpentibus in maculis irregularibus brunneis insidentibus; setulis paucis 25-30 longis, fuscis, leviter curvulis, apice acutis; conidiis continuis, hyalinis, oblongo-cylindraceis, 18-20 \approx 5-6.

Sur *Lonicera Etrusca*. Attique, près de Villia.

Colletotrichum Imperatae, J. Politis, nov. spec.

Acervulis erumpentibus, sparsis v. gregariis, nigris; setulis basi 4-5 μ . cr., apice acutis, 70-90 μ . longis, fuligineis, subrectis v. curvulis; conidiis continuis falcata-fusoideis, hyalinis 25-30 \approx 4-5; conidophoris fasciculatis, hyalinis, cylindraceis, 20-25 μ . longis.

Sur les feuilles d'*Imperata cylindrica*. Attique, près de Podoniphti.

MARSONIA

Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc. F. ital. t. 1095. — *Leptothyrium Juglandis*

Lib. Exs. n. 164. — *Gloeosporium Juglandis* (Lib.) Mont. Sacc. Syll. III, p. 768.

Sur les feuilles de *Juglans regia*.

MONOCHETIA

Monochetia Saccardoi Speg.

Sur les feuilles desséchées de *Quercus coccigera*. Attique.

CRYPTOSPORIUM

Cryptosporium Psoraleae, J. Politis, nov. spec.

Acervulis numerosis gregariis, saepe confluentibus, rufo-brunneis. primo tectis demumque, epidermide, lacerata, centro erumpentibus; conidiis falcatis

utrinque acutiusculis, hyalinis continuis, guttulis oleosis repletis, 19-22 × 2, 5-3 in conidiophorum simplicium brevium apicibus.

Sur les tiges de *Psoralea bituminosa*. Attique, près de Villia.

Fam. MUCEDINACEAE

OIDIUM

Oidium erysiphoides Fr. Syst. Myc. III, p. 41, Sacc. Syll. IV, p. 41.

Sur les feuilles de *Cucumis*, *Trifolium*, *Cichorium* etc. Attique.

Oidium monilioides Link. Sp. I, p. 122.—*Acrosporium monilioides* Nees, Sacc. Syll. III, p. 46.

Sur *Triticum*, *Hordeum*, *Avena*, *Poa* etc. Attique.

Oidium Evonymi-japonici (Arcang.) Sacc.—Syll. VVIII, p. 506.

Sur *Evonymus japonicus*. Athènes, Maroussi, Kiphissia.

Oidium Cynarae Ferraris e Masca.—*Ovalariopsis Haplophyli* (P. Magn.)

Sur les feuilles de *Cynara scolymus*. Attique.

Oidium Verbenacae Pass. in Myc. Univ. n. 789, Sacc. Syll. IV, p. 42.

Sur les feuilles de *Salvia Verbenaca*. Attique, près de Koropi.

Oidium Ceratoniae Comes.

Sur les feuilles de *Ceratonia siliqua*. Attique.

Oidium Tuckeri Berk. in Garden Chron. 1847, p. 779. Sacc. Syll. IV, p. 42.

Sur les feuilles de *Vitis vinifera*. Attique.

Oidium Quercinum Thüm. Contr. ad. flor. myc. lusit. p. 6, Sacc. Syll. IV, p. 44.

Sur les feuilles de *Quercus*. Attique.

Oidium leucoconium Desm. Ann. de Sc. Natur. 1829, XIII, p. 102, tab. 6, fig. 1, 2.—Sacc. Syll. IV, p.

Sur *Rosa*. Attique.

Oidium Abelmoschi Thüm. in Grevillea, Sacc. Syll. IV, p. 42.

Sur les feuilles de *Hibiscus esculentus*. Attique.

Oidium tabaci Thüm. Contr. Myc. Lus. n. 218, Sacc. Syll. IV, p. 45.

Sur *Nicotiana tabacum*. Attique.

BOTRYTIS

Botrytis cinerea Pers. Syn. p. 690, Sacc. Syll. IV, p. 45.

Sur *Vitis vinifera*. Attique.

Botrytis vulgaris Fr. Syst. Mycol. III, p. 398. Sacc., F. ital. t. 693. — *Polyactis vulgaris* Link. Corda. Ic. I, fig. 250. — *Botrytis Polyactis* Link. — *Monilia vulgaris* Pers. Sacc. Syll. IV, p. 128.

Champignon commun. Attique.

MONILIA

Monilia cinerea Ron. Handbuch. p. 76, fig. 78, Sacc. F. ital. t. 847, Sacc. Syll., IV, p. 34.

Sur les fruits de *Prunus cerasus*. Attique.

Monilia fructigena Pers. Syn. p. 693, Sacc. F. ital. tab. 848. — *Oidium fructigenum* Link. — *Torula fructigena* Pers. Sacc. Syll. IV, p. 34.

Sur les fruits de *Pirus*, *Malus*, *Armeniaca*. Attique.

PENICILLIUM

Penicillium glaucum Link. Obs. myc. I, p. 15, Sacc. F. ital. t. 892. — *Aspergillus simplex* Pers. — *Botrytis glauca* Spreng. — *Penicillium crustaceum* Fr. — *Penicillium expansum* Link., Sacc. Syll. IV, p. 78.

Champignon commun. Attique.

Penicillium candidum Link. Obs. mycol. I, p. 15, Sacc. F. ital. t. 891, Sacc. Syll., IV, p. 79.

Champignon commun. Attique.

ASPERGILLUS

Aspergillus glaucus (L.) Link. Sp. pl. Fungi I, p. 67. — *Micor glaucus* L. — *Monilia glauca* Pers., Sacc. Syll. IV, p. 64.

Champignon commun. Attique.

Aspergillus griseus Link. Sp. pl. Fungi I, p. 69, Bon. Hande, p. 112, fig. 188, Sacc. Syll. IV, p. 65.

Champignon commun. Attique.

VERTICILLIUM

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold.

Sur *Hibiscus esculentus* etc. Attique.

SEPTOCYLINDRIUM

Septocylindrium dissiliens (Duby) Sacc. Mich. I, p. 89, F. ital. t. 74. — *Torula dissiliens* Duby in Rabenh. F. Eur. n. 1874, Sacc. Syll. IV, p. 225.

Sur les feuilles de *Vitis Vinifera*. Attique, près de Vasilikon.

RAMULARIA

Ramularia lactea Desm. Sacc. Mich. II, p. 549, F. ital. t. 996. — *Fusisporium lacteum* Desm. Ann. Ss. nat. 1850, p. 109. — *Ramularia Violae* Fuck. Symb. myc. p. 361, t. I, f. 26. Sacc. Syll., IV, 558. p. 201.

Sur les feuilles de *Viola odorata*. Attique, près de Sépolia.

Ramularia Cynarae Sacc. Mich. I, p. 536, F. ital. t. 597, Sacc. Syll. IV, p. 208. Sur *Cynara Scolymus*. Attique.

Ramularia Marrubii C. Man. Sacc. Syll. X, p. 560.

Sur les feuilles de *Marubium vulgare*. Attique, près de Sépolia.

TRICHOTECIUM

Trichotecium roseum (Pers.) Link. Observ. mycol. I, p. 16, f. 27, Sacc. F. ital. t. 956. — *Trichoderma roseum* Pers. Syn. p. 231. — *Puccinia rosea* Corda. — *Sporocephalum roseum* Chev. — *Trichoderma rosea* Hoffm. — *Dactylium roseum* Berk. Sacc. Syll. IV, p. 178.

Sur feuilles desséchés. Attique.

Fam. DEMATIACEAE

CONIOSPORIUM

Coniosporium Agaves Pass. Sacc. Syll. X, p. 571.

Sur les feuilles d'*Agaves americana*. Attique, près de Patissia.

CYCLOCONIUM

Cycloconium Oleaginum Cast. in Thüm. Ölb. p. 38, Sacc. Syll. IV, p. 343.

Sur les feuilles d'*Olea europaea*. Attique.

CLASTEROSPORIUM

Clasterosporium carpophillum (Lév.) Aderh. — *Cladosporium carpophillum* Lév. — *Clasterosporium Amygdalearum* (Pass.) Sacc., Syll. IV, p. 391.

Sur les feuilles de *Persica*, *Cerasus*, *Amygdalus*, *Armeniaca*. Attique.

CLADOSPORIUM

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. Observ. Mycol. II, p. 37. Mich. II, p. 472, F. ital. t. 1202. — *Acladium herbarum* Link. Obs. I, p. 10. — *Dematinm herbarum* Pers. Syn. p. 699. — *D. Brassicae*, Pers. I, c. — *D. Pullulans* De Bary et Löw. Sacc. Syll. IV, p. 231.

Champignon commun. Attique.

Cladosporium macrocarpum Preuss. Fung. Hoyersw. n. 46 et in Sturn. D. O. Fl. t. 14, Sacc. Syll. IV, p. 362.

Sur *Daucus carota*. Attique, près d'Athènes.

Cladosporium Euphorbiae, J. Politis, nov. spec.

Gaespitulis parvis, nigricantibus, dispersis, v. gregariis; conidiophoris in fasciculos densos, erectos, atro-olivaceos confertis, septatis, 40-70 \times 5-6; conidiis acrogenis flavido-brunneis, ovoideis, v. oblongis, continuis v. uniseptatis, 5-11 \times 4-5.

Sur *Euphorbia Sibthorpii*. Attique, près d'Athènes.

FUSICLADIUM

Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck. Symb. Myc. p. 357. Sacc. Mich. II, p. 555. Eriks. Odlad. t. VII.—*Helminthosporium pirinum* Lib. Exs. 188.—*Fusicladium virescens* Bon. Handb. p. 80 f. 94.

Sur *Pirus communis*. Attique.

Fusicladium dentriticum (Wallr.) Fuck. Symb. myc. c. 357, Eriks. Odlad. tab. VI, Sacc. F. ital. tab. 782.—*Cladosporium dendriticum* Wallr. Fl. crypt. it. p. 169, Sacc. Syll. IV, p. 345.

Sur *Pirus Malus*.

POLYTHRINCUM

Polythrincium Trifolii Kunze. Myk. Heft. I, p. 13, t. I, f. 8, Corda Ic. fung. IV, fig. 25, Sacc. Syll. IV, p. 350.

Sur les feuilles de *Trifolium repens*. Attique, près de Kiphissia.

STIGMINA

Stigmina Platani (Fuck.) Sacc. F. ital. t. 931.—*Stigmella Platani* Fuck. in bot. Zeit. 1871, p. 27 et Hedw. 1872, p. 182, Sacc. Syll. IV, p. 394.

Sur les feuilles de *Platanus orientalis*. Attique, près de Podoniphti.

HETEROSPORIUM

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc.—*Helminthosporium gracile* Wallr. Fl. crypt. n. 1503, ?—*Heterosp. echinulatum* Sacc. Mich. II, p. 364, F. ital. t. 834, Sacc. Syll. IV, p. 480.

Sur les feuilles d'*Iris germanica*. Attique, dans les jardins.

MACROSPORIUM

Macrosporium rosarium Penz. F. Agrum. n. 131, et in F. ital. 1208, Sacc. Syll. IV, p. 531.

Sur les feuilles de *Citrus Limonium*. Attique, près de Kallithea et Eleusis.

Macrosporium commune Rabh. Fungi Eur. n. 1360, Sacc. F. ital. t. 1207, Sacc. Syll. IV, p. 524.

Ce champignon, qui est commun, produit sur les feuilles de *Vicia Faba* des taches desséchées d'un brun noirâtre.

Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. F. it. t. 353. — *Stemphylium trichellum* Arc. et Sacc. Erb. critt. ital. Ser. II, n. 698, Sacc. Syll. IV, p. 525.

Sur les feuilles d'*Evonymus japonicus*. Attique, près d'Athènes.

ALTERNARIA

Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. Mich. II, p. 172 et F. ital. t. 736. — *Macrosporium Brassicae*, Berk. Sacc. Syll. IV, p. 546.

Sur les feuilles de *Brassica oleracea*.

Alternaria Brassicae (Berk.) f. *acanthi*, J. Politis.

Maculis velutinis; conidiophoris caespitosus, numerosis, diversentibus, simplicibus, septatis, fuligineis, 40-60 × 3-5; conidiis conoideis fuligineis, 4-9 septis transv. praeditis, ad septa constrictis, longitudinaliter septatis, 30-60 × 10-12.

Sur les feuilles d'*Acanthus mollis*. Attique, près d'Athènes.

Alternaria tenuis Nees Syst. p. 72, f. 68, Sacc. F. ital. t. 737, Sacc. Syll. IV, p. 545.

Champignon commun. Attique.

Alternaria Vitis Cav. — Sacc. Syll. X, p. 679.

Sur *Vitis vinifera*. Attique.

Alternaria Solani Sorauer. — *Macrosporium Solani* Ell. et Mart.

Sur les feuilles de *Solanum tuberosum*, *Solanum Lycopersicum* et *Solanum Melongena*. Attique.

CERCOSPORA

Cercospora beticola Sacc. Ven. Ser. V, p. 189, F. ital. t. 669, Sacc. Syll. p. 456.

Sur les feuilles de *Beta vulgaris*. Attique.

Cercospora smilacina Sacc. Mich. II, pag. 364, F. ital. t. 681. — *Cercospora Smilacis* Peck. 33, Rep. St. Mus. p. 29, t. II, Sacc. Syll. IV, p. 476.

Sur les feuilles de *Smilax aspera*. Attique, près de Maroussi, Tatoï, Kiphissia.

Cercospora Myrti Erikss. Odlad. växters. p. 80, t. IX, Sacc. Syll. IV, p. 462.
Sur les feuilles de *Myrtus communis*. Attique, près de Tatoï.

Cercospora Capparidis Sacc. F. Ven. Ser. V, pag. 189, F. ital. t. 653, Sacc. Syll. IV, p. 435.
Sur les feuilles de *Capparis spinosa*. Attique.

Fam. TUBERCULACEAE

TUBERCULARIA

Tubercularia concentrica Mont. et Fr. Notice etc., in Ann. Sc. nat. (1836) VI, p. 28, Sacc. Syll. IV, p. 647.
Sur les feuilles d'*Agave americana*. Attique, près d'Athènes.

VOLUTELLA

Volutella fusarioides Penz. in Mich. II, p. 484, Fung. ital. t. 1211, Sacc. Syll. IV, p. 687.
Sur les feuilles desséchées de *Citrus Limonium*. Eleusis.

FUSARIUM

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc. Mich. II, pag. 487, F. ital. t. 1214.
— *Selenosporium sarcochroum* Desmaz. in Ann. Sc. natur. 1850, XIV, pag. III, Sacc. Syll. IV, p. 694.
Sur *Citrus Limonium*. Attique, près d'Eleusis.

Fusarium Solani (Mart). Sacc. Mich. II, p. 296. — *Fusisporium Solani* Mart. Kartoff. Epid. t. III, f. f. 25-30, Sacc. Syll. IV, p. 705.
Sur *Solanum tuberosum*. Attique.

Fusarium vasinfectum (Atk.) — *Fusar. niveum* E. Smith.
Sur *Hibiscus esculentus*, *Capsicum annumm* etc. Attique.

Fusarium roseum Link. Sp. pl. Fungi II, p. 105, Corda, Ic. fung. I, pag. 3, f. 55. — *Fusidium roseum* Link. Obs. II, pag. 31, Sacc. Syll. IV, p. 699.
Sur branches desséchées de *Ficus carica*, sur les feuilles desséchées de *Brassica oleracea* etc. Attique.

TABLE DES NOMS DES FAMILLES ET DES GENRES

| | Page | | Page |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Aecidium | 12 | Dematiaceae | 38 |
| Agaricaceae | 5 | Diaporthe | 18 |
| Alternaria | 40 | Didymosphaeria | 16 |
| Antennaria | 15 | Diplodia | 28 |
| Armillaria | 5 | Diplodina | 31 |
| Ascochyta | 30 | Erysiphe | 14 |
| Aspergillus | 37 | Exoascaceae | 19 |
| Asteroma | 25 | Exoascus | 19 |
| Botryodiplodia | 30 | Fomes | 7 |
| Botrytis | 36 | Fusarium | 41 |
| Bremia | 20 | Fusicladium | 39 |
| Camarosporium | 32 | Gloeosporium | 34 |
| Capnodium | 15 | Gymnosporangium | 9 |
| Ceratostomataceae | 18 | Haplosporella | 27 |
| Cercospora | 40 | Hendersonia | 31 |
| Cladosporium | 38 | Heterosporium | 39 |
| Clasterosporium | 38 | Hypocreaceae | 19 |
| Clytocybe | 6 | Lactarius | 6 |
| Coleosporium | 8 | Lentinus | 7 |
| Colletotrichum | 35 | Lepiota | 5 |
| Collybia | 6 | Leptosphaeria | 16 |
| Coniosporium | 38 | Limacinia | 15 |
| Coniothyrium | 27 | Lycoperdaceae | 5 |
| Cryptosporium | 35 | Lycoperdon | 5 |
| Cycloconium | 38 | Macrophoma | 25 |
| Cystopodaceae | 19 | Macrosporium | 39 |
| Cystopus | 19 | Marsonia | 35 |
| Cytospora | 25 | Melampsora | 8 |
| Cytosporella | 25 | Melanconiaceae | 34 |

| | Page | | Page |
|------------------------------|------|------------------------------|------|
| Microdiplodia | 27 | Russula | 6 |
| Monilia | 37 | Septocylindrium | 37 |
| Monochetia | 35 | Septoria | 32 |
| Mucedinaceae | 36 | Sphaerella | 16 |
| Mucor | 19 | Sphaeriaceae | 16 |
| Mucoraceae | 19 | Spherioidaceae | 22 |
| Nectriella | 19 | Sphaerotheca | 14 |
| Oidium | 36 | Sphaerulina | 16 |
| Ophiobolus | 18 | Stereum | 7 |
| Paxillus | 6 | Stigmina | 39 |
| Penicillium | 37 | Theichospora | 18 |
| Perisporiaceae | 14 | Thelephoraceae | 7 |
| Peronospora | 20 | Tilletia | 13 |
| Peronosporaceae | 20 | Trametes | 7 |
| Phleospora | 34 | Tricholoma | 6 |
| Phoma | 23 | Trichotecium | 38 |
| Phragmidium | 12 | Tuberculaceae | 41 |
| Phylactinia | 14 | Tubercularia | 41 |
| Phylosticta | 22 | Uncinula | 14 |
| Phytophthora | 21 | Uredinaceae | 8 |
| Plasmopara | 20 | Uredo | 12 |
| Pleospora | 17 | Urocystis | 13 |
| Pleurotus | 6 | Uromyces | 8 |
| Podosphaera | 14 | Ustilaginaceae | 13 |
| Polyporaceae | 7 | Ustilago | 13 |
| Polyporus | 7 | Valsa | 18 |
| Polythrincium | 39 | Valsaceae | 18 |
| Puccinia | 9 | Vermicularia | 25 |
| Rabdospora | 34 | Verticillium | 37 |
| Ramularia | 38 | Volutella | 41 |
| Rosellinia | 18 | | |