

ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ*

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ

• • •

Ἡ χλωρὶς τῆς Ἀττικῆς ὡς καὶ τῆς ἄλλης Ἐλλάδος ἔξητάσθη ὑπὸ πολυαρίθμων ἐρευνητῶν. Αἱ ἐρευναι δῆμως αὗται ἀφορῶσι κυρίως εἰς σπερματόφυτα, τὸ δὲ ἰστορικὸν τῶν περὶ τὴν συλλογὴν καὶ σπουδὴν τῶν σποριοφύτων τῆς Ἀττικῆς ἀσχοληθέντων φυσιοδιφῶν ἔχει οὕτως: Τῷ 1878 ὁ F. Schmitz¹ ἡσχολήθη περὶ τὴν διάγνωσιν καὶ βιολογίαν μικροῦ ἀριθμοῦ φυκῶν τῆς Ἀττικῆς.

Βραδύτερον ὁ G. B. De Toni² (1901) ἐδημοσίευσεν εἰς τὸ φυκολογικὸν περιοδικὸν «La nuova Notarisia» κατάλογον τῶν ὑπὸ τοῦ A. Forti ἐν Σουνίῳ συλλεγέντων φυκῶν, περιλαμβάνοντα 43 εἶδη, ὃν τὸ πλεῖστον μέρος ἀνήκει εἰς τὰ διατομώδη. Τέλος, οἵ παρὰ τῆς Γαλλικῆς κυβερνήσεως ἀποσταλέντες φυτολόγοι R. Maire καὶ M. Petit-mengin ἔξήτασαν φυτολογικῶς διάφορα τῆς Ἐλλάδος μέρη, ὁ δὲ Maire ἐκτὸς τῆς συλλογῆς φανερογόνων φυτῶν ἡσχολήθη καὶ περὶ τὴν συλλογὴν σποριοφύτων τῆς Ἀττικῆς καὶ ἄλλων μερῶν τῆς Ἐλλάδος, τὰ δὲ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν τούτων ἐδημοσιεύθησαν ἐν Παρισίοις, εἰς σχετικὰς πραγματείας³. Τοιαύτη ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ ἰστορικὴ ἀνασκόπησις τῶν ἀφορωσῶν εἰς τὴν χλωρίδα τῶν σποριοφύτων τῆς Ἀττικῆς ἐρευνῶν. Τὸ ἐπιστημονικὸν δῆμως ἔργον, ἐξ οὗ ἔξαρταται ἡ γνῶσις τῆς χλωρίδος ταύτης δὲν συνεπληρώθη. Ἐλάχιστα ἐδημοσιεύθησαν περὶ τῶν μυκήτων καὶ τῶν φυκῶν τῆς Ἀττικῆς ὡς καὶ τῶν θαλλοφύτων τῆς ἄλλης Ἐλλάδος. Ἀκολουθοῦντες τὴν ὅδον, ἦν ἐχάραξαν οἵ προηγηθέντες ἥμῶν ἐν τῇ φυτολογικῇ τῆς Ἐλλάδος ἐρεύνῃ ἐμπνευσμένοι τῆς ἐπιστήμης μύσται, ἡθε-

* Ἀνεκοινώθη κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 16 Μαρτίου 1933.

¹ SCHMITZ F. Über grüne Algen aus dem Golf von Athen, *Sitzungsber. Der Naturf. Gesellsch.*, Halle, 1878.

² DE TONI G. B. Alghe raccolte al Capo Sunio dal Dott. Achille Forti, *La nuova Notarisia*, p. 88, 1901.

³ COPPEY A.—Contribution à l'Étude des Muscinées de la Grèce, Nancy, 1908.—Deuxième contribution à l'Étude des Muscinées de la Grèce, Nancy, 1909.

λήσαμεν καὶ ἡμεῖς, δι' ὅλων τῶν δυνάμεων, νὰ συμβάλωμεν εἰς συμπλήρωσιν τῶν κενῶν τῆς Ἑλληνικῆς χλωρίδος διὰ τῆς ἐνδελεχοῦς σπουδῆς τῶν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀγνώστων θαλλοφύτων τῆς Ἑλλάδος. Ἐπὶ μῆνας διατρέξαντες, τῷ 1921, τὴν Μακεδονίαν πρὸς σπουδὴν τοῦ φυτικοῦ αὐτῆς πλούτου συνελέξαμεν, κατ' Αύγουστον, 140 εἴδη θαλασσίων φυκῶν εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς χερσονήσου τοῦ Ἀθω. Τὰ εἴδη ταῦτα, ὃν τὰ περισσότερα ἦσαν νέα διὰ τὴν Ἑλληνικὴν χλωρίδα, συνελέγησαν πλησίον τῶν μονῶν Βατοπεδίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ἰβήρων, Λαύρας, Ἀγ. Διονυσίου, Ἀγ. Γρηγορίου, Ξενοφῶντος καὶ Δοχειαρίου. Τὰ πορίσματα τῶν φυκολογικῶν τούτων ἔρευνῶν ἐδημοσιεύσαμεν ἐν τῇ Ἐπετηρίδι τῆς Σχολῆς τῶν Φυσικῶν καὶ Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν¹. Τὸ θέρος τοῦ ἔτους 1923 ἐπεσκέφθημεν τὰς νήσους Ἀνδρον, Τῆνον, καὶ Σύρον, ἥσχοληθμημεν δὲ περὶ τὴν ἔρευναν τῆς θαλασσίας αὐτῶν χλωρίδος καὶ ἐδημοσιεύσαμεν κατάλογον τῶν ἐν Σύρῳ ἀνευρεθέντων ὑφ' ἡμῶν θαλασσίων φυκῶν εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν² καὶ εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Θαλασσογραφικῆς ἐπιτροπῆς³. Ἐπίσης εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐδημοσιεύθη, τῷ 1926, ἡμετέρᾳ ἐργασίᾳ ἀφορῶσα εἰς τὴν παρουσίαν Ἀλιφύλου τῆς παραφυλλοειδοῦς ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς θαλάσσαις⁴. Βραδύτερον ἐδημοσιεύσαμεν δύο ἄλλας φυκολογικὰς ἐργασίας, ὃν ἡ μὲν ἀφορῶσα εἰς τὴν θαλασσίαν χλωρίδα τῆς νήσου Κρήτης ἡ δὲ εἰς τὰς ἐπὶ τῶν θαλασσίων τῆς Ἑλλάδος φυτῶν ἔρευνας. Καὶ ἡ μὲν πρώτη τῶν ἐργασιῶν τούτων ἐδημοσιεύθη εἰς τὰς πραγματείας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν⁵ ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὰ Πρακτικὰ⁶ τοῦ διὰ τὴν ἐπιστημονικὴν ἔρευναν τῆς Μεσογείου συνελθόντος ἐν Παρισίοις, τῷ 1930, διεθνοῦς συνεδρίου, ἐν τῷ δποίῳ ἐξελέγημεν εἰσηγητὴς διὰ τὴν θαλασσίαν χλωρίδα τῆς Μεσογείου. Πλὴν τούτων ἐπεδόθημεν εἰς τὴν μελέτην τῆς θαλασσίας χλωρίδος τῆς Ἀττικῆς. Οἱ ἔρευνητὴς ὅμως τῆς θαλασσίας χλωρίδος δέον νὰ διαθέτῃ ἵκανὰ μέσα διὰ τὴν ἔρευναν τοῦ βυθοῦ, ἥτις ἐμφανίζει μεγάλας δυσχερείας. Μὴ διαθέτοντες τὰ μέσα ταῦτα περιωρίσθημεν εἰς τὴν ἔρευναν τῶν ἀβαθῶν μερῶν, διὰ δὲ τὰ βάθη τὰ μὴ ὑπερβαίνοντα τὰς 30 ὁργιὰς ἔχονται ποιήσαμεν καρποφόρως δύτην. Τὸ ὑπὸ τούτου συλλεγόμενον ὑλικὸν συνίστατο τὸ μὲν ἐκ θαλασσίων φυκῶν, τὸ δὲ ἐκ θαλασσίων λεπιδοβραγχίων, ὃν

¹ I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Φύκη θαλάσσια τῆς χερσονήσου τοῦ Ἀθω, Ἀθῆναι, 1925.

² I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Φύκη θαλάσσια τῆς νήσου Σύρου, Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, σ. 480, 1927.

³ I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Étude sur la flore maritime de l'île de Syra, *Bulletin de la Commission Thalassographique Hellénique*, Athènes, 1928.

⁴ I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περὶ τῆς παρουσίας Ἀλιφύλου τῆς παραφυλλοειδοῦς (*Halophila stipulacea*) ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς θαλάσσαις. Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, σ. 111, 1926.

⁵ I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περὶ τῆς θαλασσίας χλωρίδος τῆς νήσου Κρήτης, Πραγματεῖαι Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 1933.

⁶ I. X. ΠΟΛΙΤΟΥ, Plantes marines de la Grèce. Rapports de la Comission internationale pour l'exploration scientifique de la mer méditerranée. 5, 1930.

τὰ ὅστρακα πολλάκις εἶναι φορεῖς μικροσκοπικῶν φυκῶν, ἐν οἷς καταλέγονται καὶ τὰ διατομώδη. Τὰ διατομώδη εἶναι, ὡς γνωστόν, μονοκύτταρα, δρατὰ μόνον διὰ μικροσκοπίου, μορφῆς δὲ ποικιλωτάτης. Τῶν φυκῶν τούτων συνελέξαμεν πολλὰ εἴδη. Τινὰ τούτων ἀνεύρομεν ἐπὶ βεβυθισμένων σωμάτων ἢ καλύπτοντα ὡς δροφνά^α ἐπιχρίσματα μεγάλας ἔκτασεις τοῦ πυθμένος τοῦ θαλασσίου ὄγαντος, πολλὰ δὲ συνελέξαμεν ἐπὶ διαφόρων εἰδῶν Κυστοσείρας (*Cystoseira*) ἢ ἄλλων θαλασσίων φυκῶν. Πρὸς ἀποχωρισμὸν δὲ τῶν διατομωδῶν ἀπὸ τῶν φυκῶν ἐτίθεντο ταῦτα ἐντὸς ὄγαντος ἐνέχοντος μικρὰν ποσότητα ὄδροχλωρικοῦ ὁξέος. Διὰ τῆς κατεργασίας ταύτης καὶ ἐλαφρῶς τῶν Κυστοσειρῶν προστριβῆς τὰ διατομώδη, ἄτινα προσφύονται ἐπὶ ἄλλων φυκῶν διὰ μίσχων ἐκ πηκτῆς ἢ περιβάλλονται πολλὰ ὄμοι^ν ὑπὸ βλέννης, ἀποσπώμενα εὐχερῶς ἀποχωρίζονται, καθιζάνοντα δ^ο ἐπὶ τοῦ πυθμένος σχηματίζουσι μετ^ο ἄλλων οὐσιῶν καστανόχρουν ἵλυν. Μετὰ τὴν καθίξησιν, διὰ καταλλήλου τῶν διατομωδῶν μετὰ θερμότητος καὶ πυκνῶν ἀνοργάνων ὁξέων κατεργασίας ἐπιτυγχάνεται ἢ καταστροφὴ τῶν ὄργανικῶν οὐσιῶν, παραμένει δ^ο ἀνέπαφος ἢ ἐκ δύο θυρίδων μετὰ ποικίλων γλυφῶν ἀποτελουμένη μεμβρᾶνα, ἥτις, μετὰ τὴν κατεργασίαν ταύτην, ἐπιτρέπει τὸν διὰ τοῦ μικροσκοπίου ἐπιστημονικὸν προσδιορισμόν. Πλὴν τῶν ἐκ Κυστοσειρῶν καὶ ἄλλων θαλασσίων φυκῶν συλλεγέντων διατομωδῶν ἀνεύρομεν πολλὰ εἴδη τούτων καὶ ἐπὶ θαλασσίων λεπιδοβραγχίων.

^οἘκ τῶν λεπιδοβραγχίων ἔξητάσθησαν ὑφ' ἡμῶν τὰ Ὀστρείδια (*Ostrea edulis*), οἱ Κτένες (*Pecten maximus*), οἱ Μύες (*Mytilus edulis*), ίδίως δὲ αἱ Πίνναι (*Pinna nobilis*). ^εἘπὶ τῶν ὅστρακων τῶν τελευταίων τούτων, λόγῳ τῶν πολυαριθμῶν θαλαμίσκων, συσσωρεύεται ἐνδιαφέρον τὸν φυσιοδίφην ὑλικόν, ἀποτελούμενον ἐκ πολυαριθμῶν διατομωδῶν.

Πολλὰ ἐπίσης εἴδη τῶν μονοκυττάρων τούτων φυκῶν ἀνεύρομεν ἐντὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος Ὁλοθυρίων (*Holothuria*), ἄτινα ἄφθονα ἀπαντῶσιν ἐν τῇ Μεσογείῳ. Τὰ Ὁλοθυρία ἔξαγόμενα ἐκ τῆς θαλασσῆς καὶ τιθέμενα ἐν πινακίῳ ἔξεμοῦσι τὸν πεπτικὸν αὗτῶν σωλῆνα, δστις περιέχει πληθὺν διατομωδῶν. Ταῦτα καταστρεφομένης τῆς ὄργανικῆς αὗτῶν οὐσίας, διὰ καταλλήλων κατεργασιῶν, καθίστανται διαφανῆ καὶ πρόσφορα πρὸς ἀσφαλῆ διὰ τοῦ μικροσκοπίου προσδιορισμόν.

Πλὴν τῶν φυκῶν τῶν συλλεγέντων ὑφ' ἡμῶν παρὰ τὰς ἀκτὰς καὶ μικροῦ σχετικῶς βάθους διὰ τῆς χορηγιμοποιήσεως δύτου, συνελέξαμεν καὶ εἴδη τινά, ἐκβρασθέντα ὑπὸ τῶν κυμάτων μετὰ σφροδάν τριχυμίαν, εἰς τὴν παραλίαν τοῦ Φαλήρου ὡς καὶ ἐκ τῶν ἀγκίστρων ἢ τῶν δικτύων ἀλιέων ἀλιευόντων εἰς ἀναπεπταμένον πέλαγος καὶ οὐχὶ μακρὰν τῶν ἀκτῶν τῆς Αττικῆς. ^εἘξητάσθη δ^ο ὑφ' ἡμῶν ἢ θαλασσία χλωρίς τῆς Πειραιϊκῆς χερσονήσου, τοῦ λιμένος Ζέας, τοῦ λιμένος Ἡρακλέους, τοῦ κόλπου τῆς Ελευσῖνος, τῶν παραλίων τοῦ παλαιοῦ καὶ νέου Φαλήρου, τῶν δομῶν Θορικοῦ, Σουνίου καὶ Πρασιῶν. Διὰ τῶν ἡμετέρων φυκολογικῶν καὶ μυκητολογικῶν ἐρευνῶν ἀνευρέθησαν ὑφ' ἡμῶν ἐν μόνῃ τῇ Αττικῇ ὑπὲρ τὰ 500 εἴδη μυκήτων καὶ φυκῶν, ὃν τὰ 400 ὡς ἔγγιστα δὲν εἶχον

παρατηρηθῆ οὐ μόνον ἐν Ἀττικῇ ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ λοιπῇ Ἑλλάδι. Ἐπὶ πλέον ἀνεκαλύφθησαν ὑφ' ἡμῶν καὶ νέα διὰ τὴν ἐπιστήμην φυτικὰ εἴδη. Ἐπιφυλασσόμενοι δὲ ἵνα ἀνακοινώσωμεν προσεχῶς τὰ ἐπὶ τῆς μυκητολογικῆς χλωρίδος τῆς Ἀττικῆς πορίσματα τῶν ἡμετέρων ἔρευνῶν περιοριζόμεθα ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς τὴν δημοσίευσιν καταλόγου τῶν ἀνευρεθέντων ὑφ' ἡμῶν θαλασσίων φυκῶν τῆς Ἀττικῆς.

Ἐν τῷ παρόντι ἔργῳ ἡκολουθήσαμεν τὴν εἰς ζώνας διάκρισιν, τὴν χορησιμοποιηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ardissonε εἰς τὸ σύγγραμμά του, τὸ ἐπιγραφόμενον *Phycologia Mediterranea*, διότι τοιαύτη ὑποδιαιρεσίς ἀναφέρεται ἀκριβῶς εἰς τὴν θαλασσίαν χλωρίδα τῆς Μεσογείου. Ἀναφέρομεν δύνεν τὰς ἔξης καθέτους ζώνας βλαστήσεως:

- 1ῃ ζώνη, μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας τῶν ὑδάτων καὶ βάθους 5 μέτρων.
- 2ᾳ ζώνη, μεταξὺ βάθους 5 μέτρων καὶ 35 μέτρων.
- 3ῃ ζώνη, μεταξὺ βάθους 35 μέτρων καὶ τοῦ κατωτάτου ὁρίου τῆς θαλασσίας βλαστήσεως.

Ἐν τῇ 1ῃ ζώνῃ ἀνευρίσκομεν Χλωροφύκη ἀνήκοντα εἰς τὰ γένη *Ulva*, *Cladophora*, *Chaetomorpha*, *Bryopsis*, κλπ. ὡς π. χ. *Ulva lactuca*, ἣτις εἶναι κοινοτάτη εἰς τοὺς ὄρμους τῆς Ἀττικῆς, *Bryopsis plumosa*, *Cladophora prolifera*, κλπ. Ἐπίσης ἐν τῇ 1ῃ ζώνῃ ἀπαντῶσι Φαιοφύκη, ἀνήκοντα εἰς τὰ γένη *Cystosira*, *Ectocarpus*, *Padina*, ὡς π. χ. *Cystosira abrotanifolia*, *Cystosira amentacea*, *Padina Pavonia*, κλπ. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω φυκῶν, εἰς τὴν αὐτὴν ζώνην ἀνευρίσκομεν εἴδη τινὰ Ἐρυθροφυκῶν ὡς π. χ. *Corallina officinalis*, *Spyridia filamentosa*, *Hypnea musciformis*, *Digenea simplex*, εἴδη ἀνήκοντα εἰς τὰ γένη *Ceramium*, καὶ τινα Νοστοκοκιάδη, ἀνήκοντα εἰς τὰ γένη *Rivularia*, *Lyngbya*, *Calothrix*.

Ἐν τῇ 2ᾳ ζώνῃ τῆς βλαστήσεως ἀνευρίσκομεν Χλωροφύκη τινὰ ὡς π. χ. *Codium Bursa*, *Codium tomentosum*, *Halimeda tuna*, Φαιοφύκη τινὰ ὡς *Sargassum Hornschuchii*, *Cystosira Montagnei* κλπ. καὶ τινα Ἐρυθροφύκη ὡς π. χ. *Dasya elegans*, *Lithropodium expansum*, κλπ. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω φυκῶν τινά, ὡς *Codium tomentosum* καὶ *Halimeda tuna*, δύνανται νὰ ἀνευρεθῶσι τόσον εἰς τὴν 1ῃν ὁσον καὶ εἰς τὴν 2αν ζώνην βλαστήσεως, ἐν ᾗ ἀλλα εἴδη, ὡς ἡ *Vidalia volubilis*, φύκος κοινὸν παρ' ἡμῖν, δύνανται νὰ ζήσωσι καὶ ἐν τῇ 3ῃ ζώνῃ.

Ἐν τῇ 3ῃ ζώνῃ φύονται Ἐρυθροφύκη.

Πλὴν τῶν φυκῶν εἰς ὄρμους τῆς Ἀττικῆς ἀπαντῶσι τὰ ἔξης θαλάσσια φανερόγονα *Zostera marina*, *Zostera nana*, *Cymodocea nodosa*, *Posidonia oceanica* καὶ *Halophila stipulacea*, τὴν δόποιαν ἡμεῖς πρῶτοι ἀνεύρομεν φυομένην ἐν τῇ Μεσογείῳ. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὑδροβίων φανερογόνων τὴν μείζονα διάδοσιν ἔχει ἡ *Posidonia oceanica*.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

I. RHODOPHYCEAE

Fam. I.—BANGIACEAE

ERYTHROTRICHIA

Erythrotrichia ceramicola (Lyngb.) Aresch. Phyc. Scand., p. 210 (1850).—De Toni Syll. Alg. IV, p. 24.—Ardiss. Phyc. med. I, p. 473.—Flor. ital. cryptog. Algae Florideae, p. 416.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν καὶ ἐπὶ φύλλων θαλασσίων σπερματοφύτων.

Fam. II.—SQUAMARIACEAE

PEYSSONNELIA

Peyssonnelia Squamaria (Gmel.) Decaisne Pl. Arab., p. 168 (1841); J. Ag. Sp. II, p. 227; De Toni Syll. Alg. IV, p. 1697.—Flor. ital. cryptog. Algae Florideae p. 46.

“Ορμος Φαλήρου. Ἐπὶ Κυστοσειρῶν, δστράκων θαλασσίων λεπιδοβραγχίων καὶ βλαστῶν θαλασσίων σπερματοφύτων.

Peyssonnelia polymorpha (Zanard.) Schimtz in Falkenb. Meeresalg. Neap., p. 264 (1879).—Mazza Agg. Fl. mar. G. Nap., p. 98.—De Toni Syll. IV, p. 1701.—Fl. cryptog. ital. Algae: Frigid. p. 48.

“Ορμος. Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων θαλασσίων λεπιδοβραγχίων καὶ ἐπὶ Κυστοσειρῶν ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Fam. III.—RHIZOPHYLLIDACEAE

RHIZOPHYLLIS

Rhizophyllum Squamariae (Men.) Kütz. Phyc. germ., p. 334 (1845). — Ardiss. Phyc. medit. I, p. 224. — De Toni Syll. Alg. IV, p. 1678. — Fl. crypt. ital. Algae: Florideae, p. 55.

Λιμήν Μουνιχίας.

Fam. IV.—CERAMIACEAE

ANTITHAMNION

Antithamnion cruciatum (Ag.) Nág.—*Callithamnion cruciatum* Ag. Aufg. p. 637. — Harv. Phyc. brit. pl. 164. — J. Ag. Spec. Alg. II. p. 27; III. p. 18. — Hauck Meeresalg. p. 71. — De Toni Syll. Alg. IV, p. 1408. — Ardiss. Phyc. med. I, p. 76. — Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 122.

Παρὰ τὸν λιμένα Ζέας.

CALLITHAMNION

Callithamnion granulatum (Ducl.) Ag.—*Ceramium granulatum* Ducl. Ess. p. 72. *C. granulatum* Ag. Spec. Alg. II. p. 177. — J. Ag. Spec. Alg. II. p. 61; III. p. 43. — Ardiss. Phyc. med. I, p. 73. — Hauck Meeresalg., p. 87. — De Toni Syll. Alg. IV, p. 1331. — Fl. crypt. ital. Algae: Florideae, p. 137.

“Ορμος Φωρῶν (Δραπετσώνα). Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν καὶ βράχων ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

GRIFFITHSIA

Griffithsia barbata (Engl. Bot.) Ag.—*Confervaria barbata* Engl. Bot. Tab. 1814. — *Gr. barbata* Ag. Spec. Alg. II. p. 132. — J. Ag. Spec. Alg. II. p. 80. — III. p. 64. — Ardiss. Phyc. med. I, p. 84. — De Toni Syll. Alg. IV, p. 1285. — Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 151. — Hauck Meeresalg. p. 89.

Λιμήν Ήρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Griffithsia opuntioides J. Ag.—*Gr. opuntioides* J. Ag. Alg. med. p. 76. — Hauck Meeresalg. p. 94. — Ardiss. Phyc. med. I, p. 85. — De Toni Syll. Alg. IV, p. 1272. — Fl. ital. crypt. Florideae p. 155.

“Ηετωνεία. Μεταξὺ ἄλλων φυκῶν ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

DUDRESNAYA

Dudresnaya purpurifera J. Ag.—*D. purpurifera* J. Ag. Alg. med. p. 85. — Id. Spec. Alg. II. p. 108; III. p. 249. — Hauck Meeresalg., p. 100. — Ardiss. Phyc.

med. I, p. 190.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1626.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae p. 73.

Ἐπὶ βράχων παρὰ τὴν εἰσοδον τοῦ λιμένος Ζέας ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

CERAMIUM

Ceramium strictum Grev. et Harv.— *C. strictum* Grev. et Harv. in s p t.— J. Ag. Spec. Alg. II. p. 123; III. p. 97.— Hauck Meeresalg. p. 106.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 102.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1484.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 109.

Ἐπὶ βράχων καὶ φυκῶν παρὰ τὴν εἰσοδον τῶν λιμένων Ζέας καὶ Μουνιχίας.

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducl.— *Confervaria ciliata* Ellis Phil. Tr. 57. p. 425. Tab. 18 fig. h. H.— *C. ciliatum* Ducl. Ess. p. 64.— Hauck Meeresalg. p. 110.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 117.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1473.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 102.

Ἐπὶ βράχων καὶ φυκῶν παρὰ τὴν εἰσοδον τῶν λιμένων Ζέας καὶ Μουνιχίας ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Ceramium gracillimum Griff. in Harv. Phyc. brit. (1846-51).— J. Ag. Sp. II, p. 118.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 105.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1483.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 107.

Ἐπὶ βράχων καὶ φυκῶν παρὰ τὴν εἰσοδον τῶν λιμένων Ζέας καὶ Μουνιχίας ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Fam. V.—SPYRIDIACEAE

SPYRIDIA

Spyridia filamentosa (Wulf.) Harv.— *Fucus filamentosus* Wulf. crypt. aquat. p. 64.— *Sp. filamentosa* Harv. in Hook Brit. Fl. p. 336.— Hauck Meeresalg. p. 116.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 193.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1427.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Fam. VI.—GIGARTINACEAE

GIGARTINA

Gigartina Teedii (Roth) Lamour.— *Ceramium Teedii* Roth, Catal. III. p. 108.— *G. Teedii* Lamour. Ess. p. 49.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 168.— Hauck Meeresalg. p. 136.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 202.— Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 355.

Παλαιὸν Φάληρον. Εἰς ἡρεμοῦντα ὄχατα, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

GYMNOGONGRUS

Gymnogongrus Griffithsiae (Turn.) Martius.— *Fucus Griffithsiae* Turn.
Hist. Tab. 37.— *G. Griffithsiae* Martius Fl. Bras. p. 27.— Ardiss. Phyc. med. I,
p. 176.— Hauck Meeresalg. p. 139, f. 56.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 242.— Flor.
ital. crypt. Algae: Florideae, p. 347.

Ἐπὶ βράχων παρὰ τὴν εύσοδον τοῦ λιμένος Ζέας, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Fam. VII.—RHODYMENIACEAE

CHRYSYMENIA

Chrysymenia ventricosa (Lamour). J. Ag.— *Dumontia ventricosa* Lamour.
Ess. p. 45. Pl. 10, fig. 6.— *Chr. ventricosa* J. Ag. Alg. med. p. 106.— Hauck Mee-
resalg. p. 158.— Fl. ital. crypt. Florideae, p. 295.

Συνελέγη ὑφ' ἡμῶν ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, ἔνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ^{τῶν} κυμάτων μετὰ θαλασσοταραχῆν.

Chrysymenia uvaria (Wulf.) J. Ag.— *Fucus uvarius* Wulf. crypt. aquat.
N. 3.— *Chr. uvaria* J. Ag. Hlg. med. p. 106.— Hauck Meeresalg. p. 160, fig. 66.—
Ardiss. Phyc. med. I, p. 210.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 543.— Flor. ital. crypt.
Algae: Florideae, p. 295.

Ἀνευρέθη ὑφ' ἡμῶν ἐκβρασθὲν μετὰ τριχυμίαν παρὰ τὸ Παλαιὸν Φάληρον, ἐπίσης
συνελέγη διὰ Δύτου ἐπὶ Κυστοσειρῶν παρὰ τὸν λιμένα Μουνιχίας.

Fam. VIII.—HYPNAEACEAE

HYPNAEA

Hypnea musciformis (Wulf.) Lamour.— *Fucus musciformis* Wulf. in
Jaqu. Coll. III. p. 154.— *Hypnea musciformis* Lamour. Ess. p. 43 (?).— Hauck
Meeresalg. p. 189.— Ardiss. Phyc. med. I. p. 281.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 472.—
Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 330.

Κοινὸν φῦκος τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Fam. IX.—GELIDIACEAE

GELIDIUM

Gelidium crinale (Turn.) Lamour.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 290.— De Toni
Syll. Alg. IV, p. 146.— Hauck Meeresalg. p. 192.— Flor. ital. crypt. Algae:
Florideae, p. 362.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ βράχων, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Gelidium latifolium Born. var. *Hystrix* (J. Ag.) Hauck Meeresalg. p. 192

(1884).— De Toni Syll. Alg. IV, p. 150.— Ardis. Phyc. med. I, p. 289.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 364.

Συνελέξαμεν τὸ φῦκος τοῦτο ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου ἐνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ τῶν κυμάτων.

Fam. X.—RHODOMELACEAE

LAURENCIA

Laurencia papillosa (Forsk.) Grev.— *Fucus papilliferus* Forskal, Fl. Aeg. p. 190.— *L. papillosa* Grev.— J. Ag. Sp. Alg. II, p. 756.— Ardisson Phyc. med. I, p. 330.— Hauck Meeresalg., p. 207.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 789.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 258.

Κοινὸν φῦκος τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Laurencia paniculata (Ag.) Kütz.— J. Ag. Spec. Alg. II. p. 755; III. p. 651.— *L. paniculata* Kütz. Spec. Alg. p. 855.— Ardis. Phyc. med. I, p. 328.— Hauck Meeresalg., p. 206.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 788.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 259.

Κοινὸν φῦκος τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

DIGENEA

Digenea simplex (Wulf.) Ag.— *Confervaria simplex* Wulf. Crypt. aquat. p. 17.— Hauck Meeresalg., p. 215.

Συνελέξαμεν τὸ φῦκος τοῦτο ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, ἐνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ τῶν κυμάτων, μετὰ σφοδρὰν τριχυμίαν.

HERPOSIPHONIA

Herposiphonia secunda (Ag.) Näg Polys. und Herpos. (1846).— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1052.— *Polysiphonia secunda* Zanard. Syn., p. 64.— Ardis. Phyc. medit. I, p. 368.— Hauck Meeresalg., p. 240.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 194.

Συνελέγη μεταξὺ Κοραλλινῶν καὶ ἄλλων φυκῶν παρὰ τὸν δόμον Πρασιῶν (Πόρτο-Ράφτη).

POLYSIPHONIA

Polysiphonia opaca (Ag.) Zanard.— *Hutchinsia opaca* Ag. Syst. Alg. p. 148.— *P. opaca* Zanard. Syn. p. 63.— Hauck Meeresalg. p. 246.— Ardis. Phyc. medit. I, p. 387.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 942.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 215.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων καὶ δστροάκων θαλασσίων λεπιδοβραγχίων, ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

RYTIPHLOEA

Rytiphloea tinctoria (Clem.) Ag.— *Fucus tinctorius* Clem. Ens. p. 316.— *R. tinctoria* Ag. Syst. p. 160.— Hauck Meeresalg. p. 247, fig. 100.— Ardis. Phyc.

med. I, p. 422.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1095.— Fl. ital. crypt. Algae: Floridae, p. 189.

Συνελέγη ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, ἔνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ τῶν κυμάτων μετὰ θαλασσοταραχῆν.

HALOPITYS

Halopitys pinastroides (Gm.) Kütz. Phyc. gener., p. 433.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1081.— *Rhytiphloea pinastroides*. Ag. Syn., p. 25.

Συνελέγη ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ τῆς Ἀμφιάλης, ἔνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ τῶν κυμάτων.

VIDALIA

Vidalia volubilis (L.) J. Ag.— *Fucus volubilis* L. Syst. nat. Ed. X, p. 1344.— *V. volubilis* J. Ag. Spec. Alg. II, p. 1121.— Hauck Meeresalg. p. 250 fig. 101.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 424.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1101.— Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 187.

Συνελέγη διὰ δύτου ἐπὶ δστράκων, λίθων, βλαστῶν Ποσειδωνείας (*Posidonia oceanica*) καὶ ἐκ τῶν ἀγκίστρων ἀλιέων ἀλιευόντων οὐχὶ μακρὰν τοῦ Φαλήρου.

DASYA

Dasya elegans (Mart.) Ag.— *Rhodonema elegans* Martens, Reise nach Venedig II, p. 641. Tab. S. *D. elegans* Ag. Spec. Alg. II, p. 117.— Hauck Meeresalg. p. 253.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 494.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1201.— Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 179.

Ήετωνεία, παραλία Παλαιοῦ Φαλήρου. Ἐκβρασθὲν ὑπὸ τῶν κυμάτων.

Dasya corymbifera J. Ag.— *D. corymbifera* J. Ag. Symb. Alg. p. 31.— Hauck Meeresalg. p. 253— Ardiss. Phyc. med. I, p. 436.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1199.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 178.

Παρὰ τὴν εἰσόδον τοῦ λιμένος Μουνιχίας. Φῦκος οὐχὶ κοινόν.

Fam. XI.—CORALLINACEAE

MELOBESIA

Melobesia farinosa Lamour.— *M. farinosa* Lamour. Polyp. flex. p. 315, pl. 12, fig. 3.— Hauck Meeresalg. p. 263, fig. 107.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 445.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1764.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 28.

Κοινὸν φῦκος ἐπὶ φύλλων Ζωστῆρος τοῦ θαλασσίου (*Zostera marina*).

Melobesia Cystosirae Hauck.— Hauck Meeresalg. p. 266, Taf. III., fig. 1, 2, 6.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1770.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 31.

Ἐπὶ Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

AMPHIROA

Amphiroa rigida Lamour.— *A. rigida* Lamour. Polyp. flex. p. 297. Tab. 2, fig. 1.— Hauck Meeresalg. p. 276, fig. 113.— Ardiiss. Phyc. med. I, p. 456.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1807.

Εἰς τὰ παράλια τῆς Ἀττικῆς. Ἐπὶ βράχων, ἐν τῇ ποώτῃ ζώνῃ βάθους.

Amphiroa cryptarthrodia Zanard.— *A. cryptarthrodia* Zanard. Corall. p. 21.— Hauck Meeresalg. p. 275.— *Amph. rigida* var. *cryptarthrodia*. Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 15.

Εἰς τὰ παράλια τῆς Ἀττικῆς. Ἐπὶ βράχων.

CORALLINA

Corallina officinalis L.— *C. officinalis* L. Fauna Suec. N. 2234.— Hauck Meeresalg. p. 281.— Ardiiss. Phyc. med. I, p. 462.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1840.— Fl. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 9.

Κοινὸν φῦκος τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Corallina rubens L. Syst. Nat. Ed. XII, vol. I, p. 1304. — Hauck Meeresalg. p. 278.— De Toni Syll. Alg. IV, p. 1836. — Ardiiss. Phyc. medit. I, p. 459.— Flor. ital. crypt. Algae: Florideae, p. 12.

Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν, ἐν τῇ ποώτῃ ζώνῃ βάθους.

• • •

II. PHAEOPHYCEAE

Fam. I.— FUCACEAE

CYSTOSIRA

Cystosira Hoppii Ag. Sp. p. 59.— Valiante Monogr. die Cystoseiren p. 16, tab. VIII.— Ard. phyc. Med. part II, p. 26.

Συχνάκις ἀνευρίσκεται ἐπὶ τῶν παραλίων ἐκβραζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων.

Cystosira discors (L.) Ag. Sp. p. 62.— Ard. phyc. Med. II, p. 29.— Hauck Meeresalg. p. 297.— *Fucus discors* L. Syst. Nat. p. 717.

Εἰς τὰ παράλια τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ βράχων.

Cystosira crinita (Desfont.) Duby.— *Fucus crinitus* Desfont. Fl. Atlant. 2,

p. 425.— *C. crinita* Duby, Bot. Gall. p. 936.— Hauck Meeresalg. p. 296.— Ard. phyc. Med. II, p. 32.

Φῦκος οὐχὶ κοινόν, ἐπὶ βράχων, ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Cystosira amentacea Bory. Morée p. 319, № 1451.— Hauck Meeresalg. p. 296.— Ard. phyc. Med. II, p. 35.

Κοινὸν φῦκος τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Cystosira abrotanifolia Ag.— *C. abrotanifolia* Ag. Spec. Alg. I. p. 63.— Hauck Meeresalg. p. 298.— Ard. phyc. Med. II, p. 24.

Κοινὸν φῦκος τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Cystosira Erica marina Nau. Fl. ven VI, p. 96.

Συχνάκις ἀνευρίσκεται ἐπὶ τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς ἐκβραζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων.

SARGASSUM

Sargassum linifolium (Turn.) Ag.— *Fucus linifolius* Turn. Hist. T. 168.— *S. linifolium* Ag. Spec. Alg. I. p. 18.— Hauck Meeresalg. p. 299.— Ard. phyc. Med. II, p. 15.

Ἀνευρίσκεται ἐπὶ τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς ἐκβραζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων.

Sargassum Hornschuchii Ag.— *S. Hornschuchii* Ag. Spec. Alg. I. p. 40.— Hauck Meeresalg. p. 301.— Ard. phyc. Med. II, p. 19.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Fam. II.—DICTYOTEAE

DICTYOTA

Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. J. Ag. Spec. Alg. I, p. 92.— *Ulva dichotoma* Huds. Fl. Angl. p. 476.— *D. dichotoma* Lamour in Journ. de Bot. 1809, T. II.— Hauck Meeresalg. p. 305.

Φῦκος κοινόν, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

PADINA

Padina Pavonia (L.) Gaillon.— *Ulva Pavonia* L. Syst. Nat. II, p. 719.— *P. Pavonia* Gallion, Dict. d'Hist. Nat. LIII, p. 371.— Hauck Meeresalg. p. 310.

Κοινότατον φῦκος τῶν Ἑλληνικῶν θαλασσῶν, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

DICTYOPTERIS

Dictyopteris polypodioides (Desf.) Lamour.— *Fucus polypodioides* Desf.

Fl. Atlant. II. p. 421.— *D. Polypodioides* Lamour in Journ. de Bot. 1809. T. II. p. 130.— Hauck Meeresalg. p. 311.

Είναι φυτὸν κοινότατον τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Fam. III.— ECTOCARPACEAE

ECTOCARPUS

Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jol.— *Ceramium confervoides* Roth, Catal. I. p. 151.— *E. confervoides* Le Jol. Alg. mar. Cherb. p. 75.— Ardiss. Phyc. med. II, p. 66.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

SOROCARPUS

Sorocarpus uvaeformis Pringsh. Morph. p. 12, Taf. 3. Hauck Meeresalg. p. 333, fig. 137.

Φῦκος παρὸν ἡμῖν σπανιότατον.

SPHACELARIA

Sphacelaria cirrhosa (Roth) Ag.— *Conferva cirrhosa* Roth. Catal. II. p. 214.— *Sph. cirrhosa* Ag. Syst. p. 164.— Hauck Meeresalg. p. 344.— Ardiss. Phyc. med. II, p. 90.

Ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Sphacelaria scoparia (L.) Lyngb.— *Conferva scoparia* L. Spec. pl. p. 1635.— *Sph. scoparia* Lyngb. Hydr. dan. p. 104, Tab. 31.— Hauck Meeresalg. p. 347.— Ardiss. Phyc. med. II, p. 86.

Κοινὸν φῦκος τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

CLADOSTEPHUS

Cladostephus verticillatus (Lightf.) Ag.— *Conferva verticillata* Lightf. Fl. Scot. p. 984.— *Cl. verticillatus* Ag. Synops. Introd. p. XXV.— Hauck Meeresalg p. 350.— Ardiss. Phyc. med. I, p. 94.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Fam. IV.— MESOGLOEACEAE

CASTAGNEA

Castagnea fistulosa (Zanard.) Derb. et Sol.— *Mesogloia fistulosa* Zanard. in litt.— Menegh. Algea Ital. p. 292. *Cast. fistulosa* Derb. et Sol. Org. reprod. in

Ann. sc. nat. 3, ser. T. XIV, p. 269, pl. 33.— Hauck Meeresalg. p. 361.— Ardis. Phyc. med. II, p. 106.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐπὶ τῶν φύλλων Ζωστῆρος τοῦ θαλασσίου (*Zostera marina*),

Fam. V.—SCYTOSIPHONACEAE

SCYTOSIPHON

Scytosiphon lomentarius (Lyngb.) J. Ag.— *Chorda lomentaria* Lyngb. Hydr. Dan. p. 74. Tab. 18.— *Se. lomentarius* J. Ag. Spec. Alg. I, p. 126.— Hauck Meeresalg. p. 390.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

HYDROCLATHRUS

Hydroclathrus sinuosus (Roth) Zanard.— *Ulva sinuosa* Roth, Catal. III, p. 327, Tab. 12, fig. a.— *H. sinuosus* Zanard, Icon. phyc. adr. I, p. 109.— Hauck Meeresalg. p. 393.— Ardis. Phyc. med. I, p. 122.

Λιμήν Μουνιχίας, Ἡετωνεία. Ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

III. CHLOROPHYCEAE

Fam. I.—ULVACEAE

ENTEROMORPHA

Enteromorpha intestinalis (L.) Link.— *Ulva intestinalis* L. Fl. Suec. Ed. 2, p. 432.— Hauck Meeresalg. p. 426.

Κοινὸν φυτὸν τῶν ἀβαθῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Enteromorpha compressa (L.) Grev.— *Ulva compressa* L. Spec. Plant. II, p. 1163.— *E. compressa* Grev. Alg. Brit. p. 180, Tab. 18.— Hauck Meeresalg. p. 428.

Εἰς λιμένας καὶ ὅρμους τῆς Ἀττικῆς, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Enteromorpha clathrata (Roth) J. Ag.— *Conferva clathrata* Roth, Catal. Bot. III, p. 175.— *E. clathrata* J. Ag. Till Algern. Syst. VI, p. 153.— Hauck Meeresalg. p. 429.

Εἰς λιμένας καὶ ὅρμους τῆς Ἀττικῆς, ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

ULVA

Ulva Lactuca (L.) Le Jol.— Hauck Meeresalg. p. 435.— *U. Lactuca* L. Sp. Pl. II. p. 1163.— Le Jol. Alg. mar. Cherb. p. 38.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 193.

Κοινὸν παρ' ἡμῖν. Τὸ φυτὸν τοῦτο ἀπολυόμενον τοῦ πυθμένος καὶ φερόμενον ὑπὸ τῶν θαλασσίων ορευμάτων κατὰ πλήθη σχηματίζει πλεούσας μάζας.

CHAETOMORPHA

Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kütz.— *Conferva aerea* Dillw. Brit. Conf. Tab. 80.— *Ch. aerea* Kütz. Spec. Alg. p. 379.— Hauck Meeresalg. p. 438.— Ard. Phyc. Med. II, p. 215.

Ορμος Θορικοῦ. Ἐπὶ βράχων.

Chaetomorpha chlorotica Kütz.— *Ch. chlorotica* Kütz. Spec. Alg. p. 377.— Hauck Meeresalg. p. 439.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 212.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Chaetomorpha tortuosa (J. Ag.) Kütz.— *Conferva tortuosa* J. Ag. Alg. med. p. 12.— *Ch. tortuosa* Kütz. Spec. Alg. p. 376.— Hauck Meeresalg. p. 440.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 209.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

CLADOPHORA

Cladophora repens (J. Ag.) Harv.— *Conferva repens* J. Ag. Alg. medit. p. 13.— *Cl. repens* Harv. Phyc. brit. pl. 236.— Hauck Meeresalg. p. 450.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 222.

Κοινὸς φῦκος εἰς διαφόρους λιμένας καὶ ὅρμους τῆς Ἀττικῆς.

Cladophora repens. F. Meneghiniana.— Hauck Meeresalg. p. 450.— *Cl. Meneghiniana* Kütz. Spec. Alg. p. 417.— Id. Tab. phyc. IV. Tab. 73.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 223.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ βράχων.

Cladophora pellucida (Huds.) Kütz.— *Conferva pellucida* Huds Fl. angl. p. 601.— *Cl. pellucida* Kütz. Phyc. germ. p. 208.— Id. Spec. Alg. p. 390.— Id. Tab. phyc. III. Tab. 83.— Hauck Meeresalg. p. 451.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 225.

Λιμὴν Ζέας, Λιμὴν Μουνιχίας, Ήετωνεία. Ἐπὶ βράχων.

Cladophora utricolosa var. **ramulosa**. Hauck Meeresalg. p. 455.— *Cl. ramulosa* Menegh.— Kütz. Spec. Alg. p. 391.— Id. Tab. phyc. III. Tab. 85.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 228.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Cladophora albida (Huds.) Kütz.— *Conferva albida* Huds. Fl. Engl. p. 595.— *Cl. albida* Kütz. Phyc. germ. p. 240.— Id. Spec. Alg. p. 400.— Id. Tab. phyc. IV. Tab. 15.— Hauck Meeresalg. p. 458.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 243.

Λιμήν Μουνιχίας.

Cladophora glomerata (L.) Kütz. *F. marina*. Hauck Meeresalg. p. 459.— *Cl. glomerata γ marina* Kütz. Phyc. germ. p. 213,— *Cl. conglomerata* Kütz. Tab. phyc. III, p. 26, Tab. 92.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Cladophora crystallina (Roth) Kütz.— *Conferva crystallina* Roth, Cat. I. p. 196.— *Cl. crystallina* Kütz. Phyc. germ. p. 213 — Hauck Meeresalg. p. 460.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 235.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Cladophora fracta (Fl. Dan.) Kütz. *F. marina*. Hauck Meeresalg. 462.— *Conferva fracta* Fl. Dan. Tab. 946.— *Cl. fracta* Kütz. Phyc. gener. p. 263.

Λιμήν Ζέας, Λιμήν Μουνιχίας. Εἰς στάσιμα ὄντα.

Cladophora corynathra Kg.— Kütz Phyc. germ. p. 219.— Ard. Phyc. Med. II, p. 223.

Λιμήν Ζέας. Ήετωνία. Ἐπὶ βράχων.

Fam. II.—ANADYOMENACEAE

ANADYOMENE

Anadyomene stellata (Wulf.) Ag.— *Ulva stellata* Wulf. in Jaqu. Coll. Vol. I p. 351.— *A. stellata* Ag. Spec. Alg. I. p. 400.— Hauck Meeresalg. p. 468.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 181.

Εἰς τοὺς λιμένας καὶ ὅρμους τῆς Ἀττικῆς. Ἐπὶ Κυστοσειρῶν, ὀστράκων καὶ πετρῶν.

Fam. III.—VALONIACEAE

VALONIA

Valonia utricularis (Roth) Ag.— *Conferva utricularis*. Roth, Catal. I p. 160.— Hauck Meeresalg. p. 469.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Fam. IV.—BRYOPSIDAE

BRYOPSIS

Bryopsis plumosa (Huds.) Ag.— *Ulva plumosa* Huds. Fl. Engl. p. 571.—

Br. plumosa Ag. Spec. Alg. p. 448.— Hauck Meeresalg. p. 472.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 156.

Κοινὸν φῦκος τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῆς.

Bryopsis disticha J. Ag.— *Br. Balbisiana disticha* J. Ag. Alg. med. p. 18.— *Br. duplex* De Not.— Hauck Meeresalg. p. 474.

Bryopsis corymbosa J. Ag.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 156. Ardiss. Phyc. Med. II, p. 156.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῇ πρώτῃ ζώνῃ βάθους.

Fam. V.—CODIACEAE

CODIUM

Codium tomentosum (Huds.) Stackh.— *Fucus tomentosus* Huds. Fl. Engl. p. 514.— *C. tomentosum* Stackh.— Ner. Tab. 7 et 12.— Hauck Meeresalg. p. 479.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 168.

Συνελέγη ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Φαλήρου, ἔνθα ἔξεβράσθη μετὰ σφοδρὰν τρικυμίαν.

Codium Bursa (L.) Ag.— *Alcyonium Bursa* L. Syst. Nat. I. p. 1295.— *C. Bursa* Ag. Spec. Alg. I. p. 457.— Hauck Meeresalg. p. 479.— Ardiss. Phyc. Med. II, p. 168.

Συνελέγη ἐπὶ τῆς παραλίας τοῦ Φαλήρου, ἔνθα ἔξεβράσθη ὑπὸ τῶν κυμάτων μετὰ τρικυμίαν.

UDOTEA

Udotea Desfontainii (Lamour.) Decne.— *Flabellaria Desfontainii* Lamour. Ess. p. 58, Tab. 6, fig. 4.— *U. Desfontainii*, Decne in Nov. Ann. sc. nat. XVIII. p. 106.— Hauck Meeresalg. p. 480, fig. 211.— Ardiss. Phyc. Med. II p. 172.

Κοινὸν φῦκος τῶν Ἑλλ. θαλασσῶν. Ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

HALIMEDA

Halimeda Tuna (Ellis et Sol.) Lamour.— *Corallina Tuna* Ellis et Sol. Zooph. p. 111, Tab. 20 f. A.— *H. Tuna* Lamour. Exposit. method. p. 27.— Hauck Meeresalg. p. 482.

Κοινὸν φῦκος τῶν Ἑλλ. θαλασσῶν. Ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ ζώνῃ βάθους.

Fam. VI.—DASYCLADACEAE

DASYCLADUS

Dasycladus clavaeformis (Roth.) Ag.— *Conferva clavaeformis* Roth. Catal. III. p. 315.— *D. clavaeformis* Ag. Spec. Alg. II. p. 16.— Hauck Meeresalg. p. 489.

Κοινὸν φῦκος τῶν Ἑλλ. θαλασσῶν. Φύεται ἐπὶ ἀμμώδους πυθμένος.

Fam. VII.—ACETABULARIACEAE

ACETABULARIA

Acetabularia mediterranea Lamour. Polyp. flex. p. 249.— Hauck Meeresalg. p. 484.

Φῦκος οὐχὶ κοινόν. Συνελέγη διὰ δύτου παρὰ τὸν λιμένα Μουνιχίας.

Fam. VIII.—CAULERPEAE

CAULERPA

Caulerpa prolifera (Forsk.) Lamx.

Κοινότατον φυτὸν τῶν Ἑλλ. θαλασσῶν. Φύεται ἐπὶ πυθμένος ἀμμώδονς.

IV. CYANOPHYCEAE

Fam. I.—NOSTOCACEAE

CALOTHRIX

Calothrix crustacea (Schousb.) Thur.— *Oscillatoria crustacea* Schousb. Herb.— *C. crustacea* Thur. Not algol. I. p. 13, pl. 4.— Hauck Meeresalg. p. 432.

Παραλία Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ βράχων.

Calothrix confervicola (Dillw.) Ag.— *Conferva confervicola* Dillw. Brit. Conf. T. 8.— *C. Confervicola* Ag. Spec. Alg. p. 70.— Hauck Meeresalg. p. 493.

Ἡετωνεία. Ἐπὶ κυστοσειρῶν καὶ ἄλλων φυκῶν.

Calothrix scopulorum (Web. et Mohr) Ag.— *Calothrix scopulorum* Ag. Syst. p. 70.— *Conferva scopulorum* Web. et Mohr, Reise, p. 195, Tab. 3, fig. 3, α β.— Hauck Meeresalg. p. 494.

Ἡετωνεία. Ἐπὶ φυκῶν καὶ βράχων.

RIVULARIA

Rivularia polyotis (J. Ag.) Hauck.— *Diplotrichia polyotis* J. Ag. Alg. med. p. 10.— *R. Polyotis* Hauck, Herb. Hauck Meeresalg. p. 495.

Κοινὸν φῦκος. Φύεται ἐπὶ βράχων.

Rivularia atra Roth.— *R. atra* Roth, Catal. III. p. 340.— Hauck Meeresalg. p. 497.

Ἡετωνεία. Φύεται ἐπὶ βράχων.

ISACTIS

Isactis plana (Kütz.) Thur.— *Dasyactis plana* Kütz. Tab. phyc. II. p. 23, Tab. 73.— *Isactis plana* Thur. Classif. Nostoch. p. 382.— Hauck Meeresalg. p. 499.
Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ φυκῶν καὶ βράχων.

LYNGBYA

Lyngbya luteo-fusca (Ag.) J. Ag.— *Calothrix luteo-fusca* Ag. Aufz. No. 41.— *L. luteo-fusca* J. Ag. Alg. med. p. 11.— Hauck Meeresalg. p. 505.
Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν.

Lyngbya semiplena (Ag.) J. Ag.— *Calothrix semiplena* Ag. Aufz. No. 40.— *L. Semiplena* J. Ag. Alg. med. p. 11.

Ἡετωνεία. Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ ἄλλων φυκῶν.

OSCILLARIA

Oscillaria subsalsa Ag.— *O. Subsalsa* Ag. Syst. p. 66.— Kütz. Spec. Alg. p. 246.— Hauck Meeresalg. p. 508.

Ἡετωνεία. Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐπὶ βράχων.

Oscillaria neapolitana Kütz.— *O. neapolitana* Kütz. Phyc. gener. p. 185.— Id. Spec. Alg. p. 240.— Id. Tab. phyc. I. Tab. 39.— Hauck Meeresalg. p. 509.
Λιμὴν Φωρῶν (Δραπετσώνα), Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη).

MICROCOLEUS

Microcoleus chtonoplastes (Fl. Dan.) Thur.— *Confervula chtonoplastes* Fl. Dan. T. 1485.— *M. Chtonoplastes* Fl. Dan. T. 1485.— Hauck Meeresalg. p. 511.
Παραλία Παλαιοῦ Φαλήρου. Ἐπὶ βράχων.

SPIRULINA

Spirulina Thuretii Crouan.— *Sp. Thuretii* Crouan, Mem. soc. sc. nat. Cherb. Vol. II.— Hauck Meeresalg. p. 511.
Ἡετωνεία. Ἐπὶ βράχων.

ENTOPHYSALIS

Entophysalis granulosa Kütz.— *E. granulosa* Kütz. Phyc. generalis p. 177, Taf. 18. Fig. V.— Id. spec. alg. p. 225.— Hauck Meeresalg. p. 514.
Ἡετωνεία. Ἐπὶ βράχων.

...

V. BACILLARIOPHYTA

Fam. I.—ACHNANTHEAE

ACHNANTHES

Achnanthes Longipes Ag. Syst., p. 1.—Sm. B. D. II, p. 27, pl. 35, f. 300; V. H. Syn., p. 129, pl. 26, f. 13-16; Cleve, Syn. II, p. 195; Peragallo Diatomées Marines de France, p. 5, pl. I, f. 4-12.

Ορμος Φωρῶν. Ἐν τῇ ὑποστάθμῃ ἀποπλυμάτων διαφόρων θαλασσίων φυκῶν.

COCCONEIS

Cocconeis pinnata Greg. M. J. VII, p. 79, pl. 6, f. 1; V. H. Syn. pl. 30, f. 6-7; A. S. atl. pl. 189, f. 1-5.—*Disconeis pinn.* Cleve, Syn. II, p. 181; Perag. Diat. M. Fr. p. 11, pl. II, f. 11-15.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κοινῆς Πίννας (*Pinna nobilis*).

Cocconeis pseudo-marginata Greg. D. of Clyde p. 492, pl. 9, f. 27; V. H. Syn. pl. 29, f. 20 à 21; A. S. atl. pl. 294, f. 5 à 7; *Cocc. major* Greg. D. of Clyde pl. 9, f. 28; Perag. Diat. M. Fr. p. 12, pl. II, f. 21 à 24.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κοινῆς Πίννας (*Pinna nobilis*).

Cocconeis molesta var. *Amygdalina* (Bréb.) Grun. Cleve Syn. II, p. 174.—*Cocc. amygdalina* Bréb. V. H. Syn. pl. 30, f. 5, 35; Perag. Diat. M. Fr. p. 14, pl. III, f. 31.

Λιμὴν Ηρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Cocconeis distans (Greg.) A. S. Nord. Diat. pl. 3, f. 22, 23; atl. pl. 193, f. 29, 36, 40; Per. Villefranche, p. 37, pl. 2, f. 13; Cleve, Syn. II, p. 172; Perag. Diat. M. Fr. p. 14, pl. III, f. 31.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Cocconeis scutellum Ehr.—Inf. p. 194, pl. 14, f. 8; Sm. Brit. Diat. I, p. 22, pl. 3, f. 34; V. H. Syn., p. 132, pl. 29, f. 1-3; A. S., atl., pl. 195, f. 17-20.—*Cocc. scut.* var. *genuina* Cleve, Syn., p. 170; Perag. Diat. M. Fr. p. 19, pl. IV, f. 5.

Λιμὴν Ηρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Cocconeis ornata Greg. Diat. of. Clyde. p. 491, pl. IX f. 24; Perag. Diat. M. Fr. p. 21, pl. IV, f. 14 à 16.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Cocconeis Brittanica Naeg. V. H. Syn., pl. 30, f. 1. 2.— *Cocc. scutelliformis* Grun. in Cl. et Moll. Diat.— *Cocc. Ahlefeldii* Jan. A. S. pl. 190, f. 43.— *Pleuroneis* Brit. Cleve Syn., p. 181; Perag. Diat. M. Fr. p. 22, pl. IV, f. 8-11.

*Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλήνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Fam. II.—MASTOGLOIEAE

ORTHONEIS

Orthoneis binotata Grun. *Cocc. scutellum* var. v. Roper M. J. VI. p. 24, pl. 3, f. 9.— *Cocc. Binotata* Grun. verh. 1863, pl. IV. f. 13.— *Orthoneis (Stictoneis) bin.* Grun. Novara, p. 15, V. H. Syn., pl. 28, f. 5. Diat., p. 284, pl. 29, f. 815; Perag. Diat. M. Fr. p. 27, pl. V, f. 2.

*Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλήνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Orthoneis Splendida Greg.— *Cocc. sp.* Greg. Diat. of Clyde, p. 493, pl. 9, f. 29.— *Cocc. punctatissima* Grev. M. J. 1857, p. 8, pl. 3, f. 1.— *Mastogloia cribrosa* Grun (partim). verh. 1860 p. 577, pl. 7, f. 10 a.— *Orthoneis sp.* Grun. Novara, p. 15; V. H. Syn. pl. 28, f. 1, 2; Perag. Diat. M. Fr. p. 28, pl. V, f. 8-10.

Οῷμος Φωρῶν (Δραπετοῶν). *Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Orthoneis aspera Per.— Pereg. Diat. M. Fr. p. 29, pl. V, f. 13.
Παραλία Ἀμφιάλης. *Ἐπὶ διαφόρων θαλασσίων φυκῶν.

MASTOGLOIA

Mastogloia angulata Lewis. Proceed. Ac. Nat. Sc. Philadelphie 1861, p. 65; p. 2, f. 4; A. S. atl., pl. 187, f. 4-11.— Cl. Syn., p. 147. *M. Apiculata* Grun. Verh. 1860, p. 577, pl. 7, f. 9; Perag. Diat. M. Fr. p. 30, pl. V, f. 16, 17.

Λιμὴν Μουνιχίας. *Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν καὶ ἄλλων φυκῶν.

Mastogloia quinquecostata Grun.— Verh. p. 578, pl. VII, f. 8; Per. Villefranche pl. 8, f. 21; Cleve Syn. p. 161.— Perag. Diat. M. Fr. p. 31, pl. VI, f. 3.

Mastogloia quinquecostata var. *elongata* Leud. Diat. de Ceylan p. 35, pl. 3, f. 31; A. S. atl. pl. 186, f. 12; Cleve Syn. p. 164; Perag. Diat. M. Fr. p. 32, pl. VI, f. 2.

Λιμὴν Ζέας. *Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Mastogloia Peragalli Cl.— Per. Villefranche, p. 44, pl. 3, f. 23. *Mastogl.* Per. Cl. le Diatomiste I p. 160, pl. 23, f. 7; Cleve Syn. p. 157; Perag. Diat. M. Fr. p. 32, pl. VI, f. 10-12.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατοίνι). *Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Mastogloia erythraea Grun. Verh. 1860, p. 577, pl. 6, f. 4: M. J. 1877, p. 174, pl. 194, f. 12-14; A. S. atl. pl. 186, f. 25, 26; Cleve Syn. p. 154; Perag. Diat. M. Fr. p. 34, pl. VI, f. 16, 18, 19.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν τοῦ Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Mastogloia Portierana Grun. Verh. 1863, p. 157, pl. IV, f. 3; Cleve Syn. p. 153; Perag. Diat. M. Fr. p. 35, pl. VI, f. 31.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Mastogloia laminaris Ehr. (Grun.)— *Ceratoneis lamin.* Ehr. teste Grun. Cleve Vega, p. 494, Syn. p. 153;— Perag. D. M. Fr. p. 36, pl. VI, f. 34.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Mastogloia Smithii var. *amphicephala* Grun.— *M. Smithii* var. *Smith.* Brit. Diat.— *M. Sm.* var. *amphic.* Grun. in Cl. et Moell. n° 161; V. H. Syn. pl. 4, f. 25; A. S. atl. 185, f. 13, 14; Cleve Syn. p. 152; Perag. D. M. Fr. p. 37, pl. VI, f. 42.

Παραλία Ἀμφιάλης. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Fam. III.—NAVICULEAE

NAVICULA

Navicula scopulorum var. *perlonga* Brun. Diat. esp. nouv. p. 39, pl. 15, f. 2; Cleve, Syn. I, p. 152.— *N. famelica* Castr., sec. de Toni; Per. Diat. M. Fr. p. 68, pl. VIII, f. 27.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula liber Sm. B. D. I, p. 48, pl. 16, f. 133; Donk. B. D. p. 62, pl. 9, f. 5, A. S. atl. 50, f. 16, 18; Nords. Diat. 2, f. 45; V. H. Syn., p. 104, pl. 12, f. 36, Diat. p. 222, pl. 5, f. 219; Perag. Diat. M. Fr. p. 71, pl. IX, f. 5, 6.

Ορμος Σαλαμίνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula liber var. *elongata* Grun. *Nav. Elongata* Grun.— A. S. Nords. Diat. p. 91, pl. 2, f. 42; A. S. atl. 50, f. 27; Cal. lib. var. el., Cleve, Syn. I, p. 55; Perag. Diat. M. Fr. p. 72, pl. IX, f. 12, 13.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula maxima var. *excentrica* Grun.— *Nav. excentrica* Grun. Verh. 1860, p. 545, pl. 3, f. 1.— *N. dilata*, A. S. Nords. Diat. p. 91, pl. 2, f. 43; atl. pl. 50, f. 30; Perag. Diat. M. Fr. p. 73, pl. IX, f. 18.

Ορμος Φωρῶν (Δραπετσώνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Navicula musca Greg. Diat. of Clyde, p. 479, pl. 9, f. 6; A. S. Nords. Diat., p. 86, pl. f. 15; atl. 160, f. 1, 2, 10 à 12; V. H. Diat., p. 196, pl. 26, f. 734.—

N. constricta Grun. Verh. 1860, p. 535, pl. 3, f. 18; Perag. Diat. M. Fr. p. 79, pl. XIV, f. 14 à 16.

Λιμὴν Ἡρακλέουν. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὄλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula directa var. *incus* A. S.— *N. incus* A. S. atl. pl. 47, f. 7; long. 0,13 à 0,15; Perag. Diat. M. Fr. p. 91, pl. XII, f. 2, 3, 4.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula spuria Cl. Syn. II, p. 31; Perag. Diat. M. Fr. p. 92, pl. XII, f. 5.

Navicula arenaria Donk. M. J. I, p. 10, pl. 1, f. 9; B. D. p. 56, pl. 8, f. 5; A. S. atl. pl. 47, f. 38.— *N. lanceolata* var. *ar.* V. H. Syn. p. 88, pl. 8, fig. 18; Diat. p. 186, pl. 3, f. 142; Cleve Syn. II, p. 22; Perag. Diat. M. Fr. p. 101, pl. XIII, f. 5.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Navicula cancelata Donk. B. D. p. 55, pl. 8, f. 4; A. S. Nords. Diat. pl. 2, f. 36, 37; atl. pl. 46, f. 29, 30; V. H. Syn. p. 86, pl. A. f. 16, Diat. p. 183, pl. 3, f. 138; Cleve Syn. II, p. 30.— *N. truncata* Donk. M. J. I, p. 9, pl. 1, f. 4; Perag. Diat. M. Fr. p. 101, pl. XIII, f. 7, 8.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna Nobilis*).

Navicula crucifera Grun. A. S. atl. pl. 46, f. 50, 53; V. H. Diat. p. 182 pl. 25, f. 710; Perag. Diat. M. Fr. p. 103, pl. XIII, f. 12.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὄλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula pennata A. S. atl. pl. 48, f. 41, 42, 43; Cleve Syn. II, p. 32; Perag. Diat. M. Fr. p. 104, pl. XI, f. 25, 26.

Οῷμος Σαλαμῖνος. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna Nobilis*).

Navicula crabro E. A. S. atl. pl. 69, f. 1; Perag. Diat. M. Fr. p. 110, pl. XV, f. 1, 2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna Nobilis*).

Navicula pandura var. *limitanea* A. S. atl. pl. 11, f. 23; Cleve Syn. I, p. 100; Perag. D. M. Fr. p. 112, pl. XVI, f. 1.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὄλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula incurvata Greg. T. M. S. IV, p. 44. pl. 5, f. 13; Donk. B. D. p. 49, pl. 7, f. 4; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 10; V. H. Diat. p. 195, pl. 24, f. 733; Cleve Syn. I, p. 84; Perag. Diat. M. Fr. p. 113, pl. XVII, f. 12.

Οῷμος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Navicula entomon Ehr. A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 13, 14; atl. pl. 13, f. 40, 49; Cleve Syn. I, p. 87; Perag. Diat. M. Fr. p. 114, pl. XVII, f. 14.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula Mediterranea Grun.— Cleve Syn. I p. 52; *N. gemata* var. *Mediterranea* Grun. A. S. atl. pl. 8, f. 42; Perag. Diat. M. Fr. pl. XVII, f. 5. XXI f. 5.
Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula vetula A. S. atl. 12, f. 49, Cleve Syn. I, p. 85; Perag. Diat. M. Fr. p. 117 pl. XIX, f. 17-18.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna Nobilis*).

Navicula didyma var. *major* Per; Perag. Diat. M. Fr. 118, pl. XVIII, f. 1-2.
Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna Nobilis*).

Navicula bombus Ehr.— Greg. Diat. of. Clyde p. 484, pl. 9, f. 12; Donk. B. D. p. 50, pl. 7, f. 7a; V. H. Syn. pl. B, f. 22; Diat. p. 194, pl. 3, f. 149; Perag. Diat. M. Fr. p. 119, pl. XVIII, f. 11.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula splendida Greg. T. M. S. IV, p. 44, pl. 5, f. 16, pl. 5, f. 14; V. H. Syn. pl. 9, f. 4, Diat. p. 193, pl. 26, f. 729; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 3, 4, pl. 2, f. 2; atl. pl. 13, f. 31, 32, 34.— *N. entomon* Donk. B. D. p. 49, pl. 7, f. 5.

Κολπὸς Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula apis Ehr. Donk. B. D. p. 48, pl. 7, f. 3 (?); A. S. Nord. Diat. pl. 1, f. 9, atl. pl. 12, f. 16 à 23; Perag. Diat. M. Fr. p. 121, pl. XIX, f. 3 à 8.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula Smithii Bréb. N. Sm. B. D. II, p. 92; A. S. atl. pl. 7, f. 16, 17; V. H. Syn. pl. 9, f. 12; Diat. p. 197, pl. 4, f. 151; Cleve Syn. I, p. 96.— *N. elliptica* W. Sm. B. D. I, p. 48, pl. 17, f. 152a; Perag. Diat. M. Fr. p. 123, pl. XIX, f. 26, 27, 28, 30.

“Ορμος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐπὶ θαλασσίων φυκῶν.

Navicula nitescens Greg. Donk. B. D. p. 8, pl. 1, f. 7; A. S. atl. pl. 7, f. 30 à 41; 8, f. 14 à 16; V. H. Diat. pl. 26, 747.— *N. Smithii* var. *nit.* Greg. Diat. of Clyde p. 487, pl. 9, f. 16; Perag. Diat. M. Fr. p. 124, pl. XXI, f. 1-2.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

Navicula fusca Greg. Donk. B. D. p. 7, pl. 1, f. 5; A. S. atl. pl. 7, f. 4.— *N. Fusca* var. *Cregorii* et *subrectangularis* Cl. Syn. I, p. 93-94.— *N. Smithii* Donk. B. D. p. 6, pl. 1, f. 4.— *N. Smithii* var. *fusca* Greg. Diat. of Clyde pl. 9, f. 15; Perag. Diat. M. Fr. p. 125, pl. XX, f. 5-6.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula aestiva Donk. T. M. S. VI, p. 32, pl. 3, f. 18; B. D. p. 6, pl. 1, f. 3; A. S. atl. pl. 7, f. 0-10; 2 f. 26, 31. Cleve Syn. I, p. 94; Perag. Diat. M. Fr. p. 125, pl. XX, f. 12.

Λιμήν Ζέας, Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula littoralis var. *subtilis* A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 24-25; Perag. Diat. M. Fr. p. 126, pl. XX, f. 10.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ τῶν ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας.

Navicula vacilans A. S. atl. pl. 8, f. 34-35-36; Perag. Diat. M. Fr. p. 126, pl. XX, f. 11.

Λιμήν Ζέας. Ἐπὶ τῶν ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula coffeoeformis A. S. Nords. Diat. p. 88, pl. 1, f. 22, 2, f. 13; Atl. pl. 8, f. 7; Cleve Syn. I, p. 81.— *N. suborbicularis* var. *coff.* V. H. Diat. p. 199, pl. 26, f. 749; Perag. Diat. M. Fr. p. 128, pl. XXI, f. 7 à 9.

Λιμήν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula forcipata Grev. M. J. VII, p. 83, pl. 6, f. 10, 11; Donk. B. D., p. 12, pl. 2, f. 4; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 45, pl. 2, f. 16, 18; atl. pl. 70, f. 17; V. H. Syn. p. 94, pl. 10, f. 3; Diat. p. 203, pl. 4, f. 163; Cleve Syn. II p. 65; Perag. Diat. M. Fr. p. 130, pl. XXI, f. 28.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ τῶν ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula forcipata var. *punctata* Cl. Syn. II, p. 64; Perag. Diat. M. Fr. p. 131, pl. XXI.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula abrupta Greg. Donk. B. D. p. 13, pl. 2, f. 6; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 37; atl. pl. 3, f. 1, 2; V. H. Syn. p. 94; pl. 10, f. 4; Diat. p. 203, pl. 4, f. 162; Cleve Syn. II, p. 61; Perag. Diat. M. Fr. p. 132, pl. XXI, f. 35 à 37.

Λιμήν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula lyra E. Am. I, 1 f. 9, a; Greg. Diat. of Clyde pl. 9 f. 13β; Donk. B. D. p. 14, pl. 2, f. 7; A. S. atl., pl. 2, f. 11, 16, 25; V. H. Syn. pl. 10, f. 20; Diat. p. 202, pl. 4, f. 161.— *N. Gregoriana* Grev., M. J. V., p. 10, pl. 3, f. 7; Perag. Diat. M. Fr. p. 133, pl. XXII, f. 3, 4.

Λιμήν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula lyra var. *subcarinata* A. S. *N. lyra* var. *subcarinata* A. S. atl. pl. 2, f. 5; Cleve Syn. II, p. 64; Perag. Diat. M. Fr. p. 135, pl. XXII, f. 10, 11.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ τῶν ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula lyra var. *subtypica* A. S. atl. pl. 2, f. 24; Perag. Diat. M. Fr. p. 135, pl. XXII, f. 2.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula lyra var. *intermedia* Per. Perag. Diat. M. Fr. p. 136, pl. XXIII f. 6-11.

Λιμὴν Ζέας, Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθυρίων (*Holothuria*).

Navicula clavata Greg. T. M. S. IV, p. 46, pl. 5, f. 17; Donk. B. D., p. 15, pl. 2, f. 8; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 33; atl. pl. 70, f. 50; Cleve Syn. II, p. 61; Perag. Diat. M. Fr. p. 137, pl. XXIV, f. 6-8.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula Hennedyi Sm. B. D. II, p. 93; Greg. T. M. S. IV, pl. 5, f. 3; Donk. B. D. pl. 2, f. 3; A. S. Nords. Diat. pl. 1, f. 41; Atl. pl. 3, f. 18; V. H. Syn., p. 93, pl. 9, f. 14; Diat. p. 204, pl. 4, f. 160; Cleve Syn. II, p. 57; Perag. Diat. M. Fr. p. 139, pl. XXV, f. 2 à 3.

Λιμὴν Ζέας, Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula Hennedyi var. *cuneata* Grun. A. S. atl. pl. 3, f. 4; Cleve Syn. II, p. 59; Perag. Diat. M. Fr. pl. XXV, f. 6.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula polysticta A. S. atl., pl. 3, f. 26; Perag.; Diat. M. Fr. p. 142, pl. XXV, f. 12.

Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula polysticta var. *elliptica* H. P.— *N. californica* var. *ell.* H. P. Vil-lefr. p. 55, pl. 2, f. 7; Perag. Diat. M. Fr. p. 142, pl. XXVI, f. 7.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula praetexta Ehr.— Greg. Diat. of Clyde pl. 9, f. 11.— Donk. B. D. p. 10, pl. 2, f. 1; A. S. atl. pl. 3, f. 31, 34; pl. 129, f. 7; V. H. Syn. p. 92, pl. 9, f. 13, Diat. p. 204, pl. 4, f. 159; Cleve Syn. II, p. 53; Perag. Diat. M. Fr. p. 143, pl. XXVI, f. 8 α 12.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula humerosa Bréb. Sm. B. D. II, p. 18, pl. 3, f. 3; A. S. atl. pl. 6, f. 3, 4, 5; V. H. Syn., p. 98, pl. 11, f. 20; Diat. p. 210, pl. 4; f. 182; Cleve Syn. II, p. 43.— *N. quadrata* Greg. T. M. S. IV, p. 41, pl. 3, f. 5; Perag. Diat. M. Fr. p. 146, pl. XXVII, f. 20.

Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Navicula humerosa var. *arabica* Grun. *N. arab.* Grun. A. S. atl. pl. 6, f. 14; Cleve Syn. I, p. 49; Perag. Diat. M. Fr. p. 146, pl. XXVII, f. 23.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

TRACHYNEIS

Trachyneis aspera Ehr. Cleve Syn. I, p. 191.— *T. asp.* var. *genuina*, Cleve Syn. I, p. 191.— *Stauroptera aspera*, Ehr. Am. pl. 1, f. 1, 2; *Nav. aspera* V. H. Syn. pl. 10, f. 13; B. f. 26; Diat. p. 205, pl. 4, f. 165; Donk. B. D. pl. 10, f. 1; A. S. atl. pl. 48, f. 15, 21, 22; Perag. Diat. M. Fr. p. 150, pl. XXIX, f. 1-2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Trachyneis aspera var. *intermedia* Grun. Cleve Syn. I, p. 192.— *Nav. asp.* var. *int.* Grun. Franz. Jos. Land., pl. 1, f. 20; A. S. atl. pl. 48, f. 14; Perag. Diat. M. Fr. p. 150 pl. XXIX, f. 3, 4.

Trachyneis aspera var. *vulgaris* Cleve, Syn. I, p. 191.— *N. asp.* A. S. atl., pl. 48, f. 2, 6; Perag. Diat. M. Fr. p. 150, pl. XXIX, f. 5.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Trachyneis aspera var. *pulchella* Sm. Cleve Syn. I, p. 191.— *Stauroneis pulch.* Sm. B. D. I, p. 61, pl. 19, f. 194; A. S. Atl. pl. 48, f. 12, 13; Perag. Diat. M. Fr. p. 150, pl. XXIX, f. 6.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ τῶν δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. IV.—PLEUROSIGMEAE

PLEUROSIGMA

Pleurosigma pulchrum Grun. Verh. 1860, p. 556; H. P. Pleur. p. 4, pl. 1, f. 8.— *Pl. speciosum* var. *pulchra* Cleve Syn. I, p. 44.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

Pleurosigma affine var. *Normanni* Ralfs. H. P. Pleur. p. 10, pl. 4, f. 6-7; Cleve Syn. p. 252; Perag. Diat. M. Fr. p. 162, pl. XXXII, f. 4, 6.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Pleurosigma rigidum Sm. B. D. I, p. 64, pl. 20, f. 198; V. H. Syn. pl. 19, f. 3; Diat. p. 251, pl. 6, f. 265; H. P. Pleur. p. 14, pl. 6, f. 3, 4, 6; Cleve Syn. I, f. 39.— *Pl. validum* Shadb. T. M. S. 1854, p. 16, pl. 1, f. 8.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατούνι). Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

RHOICOSIGMA

Rhoicosigma oceanicum H. P. Pleur. 33, pl. 10, f. 5, 6, 10, 11, 12. — *Rh. corsicanum* H. P. Pleur. pl. 10, f. 13, 14, 15; Perag. Diat. M. Fr. 176 pl. XXXV, f. 3 à 7.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Rhoicosigma robustum Grun. Arct. Diat. p. 58; H. P. Pleur. 33, pl. 10, f. 2, 3; Cleve Syn. I, p. 121; Perag. Diat. M. Fr. p. 176, pl. XXXV, f. 1.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Olothuria*).

Rhoicosigma Mediterraneum Cleve N. and R. Diat. p. 6, pl. 1, f. 9; Syn. I, p. 121; H. P. Pleur. p. 32, pl. 9, f. 29 à 32; Perag. Diat. M. Fr. p. 177, pl. XXXVI, f. 7 à 9.

Λιμὴν Μουνιχίας, Παραλία Ἀμφιάλης. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν.

TOXONIDEA

Toxonidea insignis Donk. T. M. S. p. 21, pl. 3, f. 2; V. H. Syn. p. 114, pl. 17, f. 10; Diat. p. 247, pl. 5, f. 256; H. P. Pleur. p. 28, pl. 9, f. 18, 19; Cleve, Syn. I, p. 45.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Fam. V.—AMPHITROPIDEAE

AMPHIPRORA

Amphiprora sulcata O. Meara, M. J. N. S. XI, p. 22, pl. 3, f. 3.— *Amph. pelagica* var. *rostrata* Brun. Diat. esp. nouv., pl. 22, f. 3.— *A. gigantea* var. *sulc.* Cl. Syn. I, p. 18; Perag. Diat. M. Fr. p. 186, pl. XXXVIII, f. 1-3.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphiprora decussata var. *septentrionalis* Grun. Arct. Diat. p. 63; Perag. Diat. M. Fr. p. 187, pl. XXXVIII, f. 8.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

TROPIDONEIS

Tropidoneis lepidoptera Greg. Clev. Syn. I, p. 25.— *A. lep.* Greg. T. M. S. V. p. 76, pl. 1, f. 39; V. H. Sypr 120, pl. 22, f. 2, 3.— *O. Lep.* V. H. Diat. p. 263, pl. 5, f. 287; Perag. Diat. M. Fr. p. 188, pl. XXXIX, f. 3 à 7.

Ορμος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Tropidoneis lepidoptera var. minor Cl. Syn. I, p. 25; Perag. Diat. M. Fr. pl. XXXIX, f. 14, 15, 16.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Tropidoneis lepidoptera var. delicatula Grev. Cleve Syn. I, p. 25.— A. Del. Grev. Ed. N. Phil. Journ. XVIII, p. 36, f. 15, 16.— Perag. Diat. M. Fr. p. 189, pl. XXXIX, f. 11-13.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Tropidoneis maxima var. subalata Cleve. Syn. I, p. 26; Perag. Diat. M. Fr. p. 190, pl. XL, f. 5, 6.

Tropidoneis vitrea var. mediterranea Grun. Cleve Syn. I, p. 27.— Amphiapr. (Plagiotrop.) med. Grun. V. H. Syn., pl. 22, f. 14; Perag. Diat. M. Fr. p. 192, pl. XLI, f. 11, 13.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνι). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

AURICULA

Auricula amphitritis Castr. Atti Nuov. Linc. p. 406, pl. 7, f. 2; Perag. Diat. de Villefr. p. 42, pl. 2, f. 18; Cleve Syn. I, p. 21; Perag. Diat. M. Fr. p. 194, pl. XLII, f. 6, 7.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Auricula insecta Grun. A. S. atl. XL, f. 2, 3 (Amphora).— *Amphora mucronata* H. L. Smith. Am. M. J. 1878, p. 17, pl. 3, f. 9; Per. Diat. M. Fr. p. 104, pl. XLII, f. 16, 18.

Σαλαμίς. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. VI.—CYMBELLEAE

AMPHORA

Amphora dubia Greg. Diat. of Clyde p. 514, pl. 12, f. 76; A. S. atl. pl. 27, f. 20; Cleve Syn. II, p. 102, pl. 4, f. 5, 6; V. H. Diat. p. 128, pl. 24, f. 672; Perag. Diat. M. Fr. p. 198, pl. XLIV, f. 1-5.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora ovalis K. Syn. f. 5, 6; Bac. p. 107; V. H. Syn. p. 59, pl. 1, f. 1; Diat. p. 127, pl. 1, f. 15; A. S. atl. pl. 26 f. 106-111. *A. ovalis* et *A. ovalis* var. *libyca* Cleve Syn. II, p. 104; Perag. Diat. M. Fr. p. 199, pl. XLIV, f. 14.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora marina Sm. V. H. Syn. p. 58, pl. 1, f. 16; Diat. p. 129, pl. 1, f. 14; A. S. atl. pl. 26, f. 14, 17, 18; Perag. Diat. M. Fr. p. 200, pl. XLIV, f. 15-17.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora proteus Greg. Diat. of Clyde p. 518, pl. 13, f. 81; A. S. atl. pl. 27, f. 3; V. H. Diat. p. 129, pl. 24, f. 671; Perag. Diat. Fr. p. 200, pl. XLIV, f. 24 à 27.

Παρὰ τὴν ἄκτην Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora proteus var. *oculata* Per.— A. sp. A. S. atl. pl. 27, f. 42-45; Perag. Diat. M. Fr. p. 201, pl. XLIV, f. 21, 22.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora Janischii A. S. atl. pl. 25, f. 51, 53, 56; Perag. Diat. M. Fr. p. 207, pl. XLIII f. 8.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora crassa var. *punctata* A. S. atl. pl. 28, f. 30-33; Perag. Diat. M. Fr. p. 208, pl. XLVI, f. 5, 9.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora proboscidea (Greg.) Cleve. Greg. Diat. of Clyde p. 526, pl. 14, f. 98 (?); Cleve Syn. II, p. 113, pl. 3, f. 19, 20, 21; Perag. Diat. M. Fr. p. 211. pl. XLVII, f. 10.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora bioculata Syn. II, p. 114, pl. 3, f. 36, 37, 38; Perag. Diat. M. Fr. p. 213, pl. XLVII, f. 14.

Παρὰ τὴν ἄκτην Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὀστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora arenaria Donk. T. M. S. 1853, p. 31, pl. 3, f. 16; A. S. atl. pl. 40, f. 8, 9, 10, 12. Cleve Syn. II, p. 133 (*Psammamphora*); V. H. Diat. p. 130, pl. 24, f. 673; Perag. Diat. M. Fr. p. 217, pl. XLVIII, f. 11, 12, 13, 15.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Amphora ostrearia Bréb. V. H. Syn. p. 55, pl. 1, f. 25; Diat. p. 139, pl. 1, f. 1; Cleve Syn. II, p. 129; Perag. Diat. M. Fr. p. 319, pl. XLIX, f. 13.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Amphora laevis var. *laevissima* Greg. Cleve, Syn. II, p. 130.— *A. laevis-sima* Greg. Diat. of Clyde, p. 513, pl. 12, f. 72; A. S. atl. pl. 26, f. 3, 13, 14; V. H. Diat. p. 139, pl. 24, f. 694; Perag. Diat. M. Fr. p. 221, pl. XLIX, f. 11.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

Amphora acuta Greg.— Diat. of Clyde, p. 524, pl. 14, f. 93; A. S. pl. 26; f. 19, 20; Cleve, Syn. II, p. 128; V. H. Diat. p. 139, pl. 24, f. 692; Perag. Diat. M. Fr. p. 222, pl. XLIX, f. 26.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora acuta var. *arcuata* S. A. atl. pl. 26, f. 27 - 29; Cleve Syn. II. 128; Perag. Diat. M. Fr. pl. XLIX f. 27, 28.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora rhombica Kitton. A. S. atl. pl. 40, f. 39; Cleve Syn. II, p. 127; Perag. Diat. M. Fr. pl. L, f. 4.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Amphora binodis var. *bigibba* Grun. *A. bigibba* Grun. A. S. atl. pl. 25, f. 66, 67, 69, 70 à 77; Cleve Syn. I, p. 120; Perag. Diat. M. Fr. pl. 50 f. 36.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Amphora costata Sm. B. D. I. p. 20, pl. 30, f. 253; Greg. Diat. of Clyde, p. 527, pl. 14, f. 99; Cleve Syn. II, p. 122; Perag. Diat. M. Fr. pl. L, f. 20.

Οφιός Φωρῶν (Δραπετσώνα). Ἐπὶ θαλασσίων φυκῶν.

Fam. I.—SURIRELEAE

CAMPYLODISCUS

Campylodiscus limpatus Bréb. Diat. de Cherbourg, p. 12, f. 1; Greg. Diat. of Clyde, p. 504, pl. 11, f. 55; A. S. atl. pl. 17, f. 2, 3; V. H. Diat. p. 380, pl. 32, f. 873; Perag. Diat. M. Fr. p. 239, pl. LIII, f. 1, 2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Campylodiscus adriaticus Grun. Verh. 1862, p. 440, pl. 11, f. 8'; A. S. atl. pl. 16, f. 13; Perag. Diat. M. Fr. p. 239, pl. LIII, f. 4.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Campylodiscus samoensis Grun. A. S. atl., pl. 15, f. 18, 20; Deby, mon. pl. 2, f. 3. *C. incertus*, A. S. atl., pl. 15, f. 13, 15; Perag. Diat. M. Fr. p. 241, pl. LIV, f. 6 - 8.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Campylodiscus parvulus Sm. B. D. I. p. 30, pl. 65, 56; V. H. Syn. p. 191, pl. 77, f. 2; A. S. atl., pl. 14, f. 31, 32; Perag. Diat. M. Fr. p. 242, pl. LIV, f. 9 et LV, f. 5-6.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Campylodiscus biangulatus Grev. T. M. S. 1862, pl. 3, f. 2; A. S. atl. pl. 14, f. 18-22; Deby mon. pl. 2, f. 12; Perag. Diat. M. Fr. p. 242, pl. LV, f. 9.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Campylodiscus biangulatus var. *Lorenziana* Grun.— *Camp. Lorenzianus* Grun. Verh. 1862, p. 442, pl. 11, f. 1-2; A. S. atl., pl. 18, f. 4, 14, f. 24; Perag. Diat. M. Fr. p. 243, pl. LV, f. 8.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Campylodiscus decorus Bréb. Diat. de Cherburg, p. 13, f. 2; V. H. Syn., pl. 75, f. 3; Diat. p. 376, pl. 32, f. 869; A. S. atl., pl. 14, f. 4; Deby mon., pl. 2, f. 16; Perag. Diat. M. Fr. p. 245, pl. LVI, f. 2-3.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Kystoseira*).

Campylodiscus decorus var. *eudecora* Per.— Diat. M. Fr. p. 245, pl. LVI, f. 1. Παρὰ τὴν ἀκτὴν τοῦ Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας.

Campylodiscus Thuretii Bréb. Diat. Cherb., pl. 1, f. 3; V. H. Syn. p. 190, pl. 17, f. 1.— *C. simulans* Greg. M. J. N. S. V. p. 77, pl. 1, f. 41; Perag. Diat. M. Fr. p. 247, pl. LVII, f. 4 à 9.

Οφιος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

SURIRELLA

Surirella fastuosa Ehr. Sm. B. D. I, p. 32, pl. 9, f. 66; V. H. Syn., p. 188, pl. 73, f. 18; A. S. atl., pl. 5, f. 7, 8, 11; Perag. Diat. M. Fr. p. 248, pl. LIX, f. 2, 3. Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Surirella fastuosa var. *suborbicularis* Grun. A. S. atl., pl. 5, f. 14; Perag. Diat. M. Fr. p. 248, pl. LIX, f. 1.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Surirella fastuosa var. *opulenta* Grun. A. S. atl., pl. 20, f. 1; Perag. Diat. M. Fr. p. 248, pl. LVIII, f. 1.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Surirella fastuosa var. *cuneata* A. S. atl., pl. 4, f. 1, 2; Perag. Diat. M. Fr. p. 248, pl. LVIII, f. 2, 3, 4.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Surirella Guinardii H. P. Villef., p. 67, pl. 1, f. 5; Perag. Diat. M. Fr. p. 248, pl. LIX, f. 4, 5.

Οφιος Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Surirella fluminensis Grun. Verh. 1862, p. 463; A. S. atl., pl. 4, f. 9, pl. 5, f. 6; Perag. Diat. M. Fr. b. 250, pl. EX, f. 1, 2.

Οφιος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Surirella intercedens var. *collare* A. S.—*Sur. collare*. A. S. atl., pl. 4, f. 14 et 19 f. 7.—*Sur. intercedens* Grun. A. S. atl., pl. 19, f. 5.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Surirella pandura Per.—*Sur. fast.* var. *panduriformis*, Per. in. lit; Perag. Diat. M. Fr. p. 251, pl. LXII, f. 4, 5.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Surirella pandura var. *contracta* Per; Perag. Diat. M. Fr. p. 252, pl. LXIII f. 2. Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Surirella gemma Ehr. Ber. Akad. 1840, p. 76, pl. 4, f. 5; Ktz. Bac., p. 62, pl. 7, f. 9; W. Sm., B. D. I, p. 32, pl. 9, f. 65; V. H. Syn. p. 187, pl. 74, f. 1-3; Diat., p. 372, pl. 13, f. 582; A. S. atl., pl. 24, f. 26, 27; Perag. Diat. M. Fr. p. 255, pl. LXVIII, f. 4.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθουρίων (*Holothuria*).

CYMATOPLEURA

Cymatopleura solea Bréb. W. Sm. I, p. 36, pl. 10, f. 78; V. H. Syn., pl. 56, f. 5 à 7; Diat., p. 367, pl. 12, f. 482 b; Perag. Diat. M. Fr. p. 259, pl. LXVIII, f. 5, 6.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

PODOCYSTIS

Podocystis adriatica K. Bac. p. 62, pl. 7, 8 et pl. 30, f. 80; Grun. in Wien. verh. pl. 10, f. 13; V. H. Syn. pl. 55, f. 8; Diat. p. 365, f. 117; Perag. Diat. M. Fr. p. 361, pl. LXVIII, f. 11.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνι). Ἐπὶ τῶν ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Podocystis spathulata Shadb. V. H. Diat. p. 365; Perag. Diat. M. Fr. p. 261, pl. LXVIII, f. 12.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Fam. VIII.—NITZCHIEAE

NITZSCHIA

Nitzschia punctata Sm.—Grun. arcl. Diat., p. 68; V. H. Syn., p. 171, pl. 57, f. 2; Diat., p. 384, pl. 15, f. 491.—*Triblionella punctata* Sm. B. D. I., p. 36, pl. 10, f. 76 α; Perag. Diat. M. Fr. p. 267, pl. LXIX, f. 22 à 24.

Οφιος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Nitzschia punctata var. *elongata* Grun. arct. Diat., p. 68; V. H. Syn., p. 171, pl. 37, f. 3; Diat., p. 385, pl. 15, f. 492; Perag. Diat. M. Fr. p. 268, pl. LXIX, f. 25.
Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzschia punctata var. *coarctata* Grun. arct. Diat., p. 68; V. H. Syn., pl. 57, f. 4; Perag. Diat. M. Fr. p. 268, pl. LXIX f. 26, 27.
Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzschia panduriformis Greg. Diat. of Clyde, p. 57, pl. 6, f. 102; V. H. Syn., p. 172, pl. 58, f. 1-3; Diat., p. 386, pl. 15, f. 500; Perag. Diat. M. Fr. p. 268, pl. LXX, f. 3-5.

Οόμος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποτλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Nitzschia plana Sm. B. D. I. p. 42, pl. XV, f. 114; V. H. Syn. 173, pl. 58, f. 10, 11; Diat. p. 387, pl. 15, f. 503; Perag. Diat. M. Fr. p. 270, pl. LXX, f. 18.
Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Nitzschia marginulata Grun. V. H. Syn. pl. 58, f. 13, 15; Perag. Diat. M. Fr. p. 270, pl. LXX, f. 14-17.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Nitzschia bilobata Sm. B. D. I. p. 42, pl. 15, f. 113; V. H. Syn. p. 175, pl. 60, f. 1; Diat. p. 389, pl. 15, f. 512.— *Amphiprora latestriata* Bréb. in Kütz. sp. alg.— *Nitzschia latestriata* Rab. Flora Eur. alg. p. 154.

Nitzschia bilobata var. *minor*. Grun. V. H. Syn. pl. 60, f. 2, 3; Diat. p. 390, pl. 15, f. 513; Perag. Diat. M. Fr. p. 273, pl. LXX, f. 27.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Nitzschia fluminensis Grun. Wien. Verh. 1862, p. 581, pl. 12, f. 35; Cl. et Grun. Arct. Diat. p. 86; V. H. Syn. pl. 62, f. 3-4; Perag. Diat. M. Fr. p. 278, pl. LXXI, f. 9.

Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzschia socialis var. *massiliensis* Grun. Arct. Diat, p. 85; Perag. Diat. M. Fr. p. 280, pl. LXXII, f. 10.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzschia angularis Sm. B. D. Syn. I. p. 40, pl. 13, f. 117; Cl. et Grun. Arct. Diat. pl. 5, f. 98; V. H. Syn. p. 177, pl. 62, f. 11-14; Diat. p. 393, pl. 16, f. 521; Perag. Diat. M. Fr. p. 284, pl. LXXIII, f. 6-7.

Οόμος Φαλήρου. Ἐπὶ ὅστρακων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Nitzschia spathulata Bréb. In. W. Sm. B. D. I, p. 40, pl. 31, f. 268; Cl. et Grun. Arct. Diat. p. 89; V. H. Syn. p. 177, pl. 62, f. 7, 8; Diat. p. 393, pl. 16, f. 523; Perag. Diat. M. Fr. p. 285, pl. LXXIII f. 4.

Λιμήν Ἡρακλέους (Κερατσίνι). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzschia valida Cleve et Grun. Cleve West. Ind. Diat. p. 12, pl. 3, f. 19; V. H. Syn. pl. 65, f. 4-5; Perag. Diat. M. Fr. p. 289, pl. LXXIX, f. 3.

Λιμήν Ἡρακλέους (Κερατσίνι). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

NITZCHIELLA

Nitzchiella longissima var. *reversa* Sm. V. H. Syn. pl. 70, f. 4; Diat. p. 405; Perag. Diat. M. Fr. p. 293, pl. LXXIV, f. 19.

Λιμήν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzchiella longissima var. *subtilis* Grun. Arct. Diat. p. 102; Perag. Diat. M. Fr. p. 204, pl. LXXIV, f. 4.

Λιμήν Ἡρακλέους (Κερατσίνι). Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Nitzchiella incerta Grun. *N. reversa* var. *major* Grun. Wien Verh. 1862, p. 582. pl. 12, f. 4.

Λιμήν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

Nitzchiella insignis Greg. M. J. V. p. 80, pl. 1, f. 46; V. H. Syn. pl. 61, f. 1; Diat. p. 391, pl. 32, f. 875.—*Pritchardia insignis* Rab. Flor. Eur. I, p. 163; Perag. Diat. M. Fr. p. 295, pl. LXXV, f. 5.

Ορμός Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. IX.—EPITHEMIEAE

RHOPALODIA

Rhopalodia musculus K. *Ep. musculus* K. Bac. p. 33, pl. 30, f. 6, W. Sm. B. D. I. p. 14, pl. I, f. 10; V. H. Syn. p. 140, pl. 32, f. 14; Diat. p. 297, pl. 9, f. 359; Perag. Diat. M. Fr. p. 302, pl. LXXVII, f. 6-16.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Rhopalodia musculus var. *gibberula* K. *Ep. gibberula* K. Bac. p. 35, pl. 29, f. 54; V. H. Syn. p. 140; Diat. p. 297, pl. 30, f. 825; Perag. Diat. M. Fr. p. 303, pl. LXXVII, f. 18-22.

Ορμός Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Fam. X.—SYNEDREAE

SYNEDRA

Synedra robusta Ralfs. In Pritch. Inf. p. 789, pl. 8, f. 3; V. H. Syn. pl. 42, f. 6 et 7; Diat. p. 316, pl. 30, f. 836, 837; Perag. Diat. M. Fr. p. 309, pl. LXXVIII, f. 3-5.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Synedra crystallina Lyngb. Kütz Bac. p. 69, pl. 16, f. 1; Sm. B. D I. p. 74, pl. 12, f. 101; V. H. Syn. p. 153, pl. 42, f. 10; Diat. p. 315, pl. 10, f. 435; Perag. Diat. M. Fr. p. 310, pl. LXXIX, f. 1.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Synedra fulgens (Kütz) Sm. B. D I. p. 74, pl. 13, f. 103, V. H. Syn. pl. 43, f. 1, 2; Diat. p. 316, pl. 10, f. 436; Perag. Diat. M. Fr. p. 311, pl. LXXIX, f. 5.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Synedra fulgens var. *gigandea* Lob. *Syn. gig.* Lob. Linn. 1840, p. 276, pl. 6.—*Syn. connigera* Grun. Honduras Diat. p. 167, pl. 193; Perag. Diat. M. Fr. p. 312, pl. LXXIX, f. 6.

Ορμός Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Synedra Hennedyana Greg. Diat. of Clyd. p. 60, pl. 6, f. 108; V. H. Syn. pl. 42, f. 3; Diat. p. 317, pl. 10, f. 438; Perag. Diat. M. Fr. p. 313, pl. LXXVIII, f. 9. Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Synedra Hennedyana var. *insignis* Grun.—*Syn. crystallina*, var. *insignis* Grun. Honduras Diat. p. 167, pl. 193, f. 11.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Synedra undulata Bail.—New. sp. and. loc. etc. p. 15, f. 24, 25 (Toxarium) Sm. B. D. II. p. 97; V. H. Syn. pl. 42, f. 2; Diat. p. 317, pl. 10, f. 437; Perag. Diat. M. Fr. p. 314, pl. LXXVIII, f. 7.

Παραλία Ἀμφιάλης. Ἐπὶ θαλασσίων φυκῶν.

Synedra baculus Greg. T. M.S. 1867, p. 88, pl. 1 f. 54; V. H. Syn. pl. 42, f. 9; Diat. p. 316, pl. 30, f. 835; Perag. Diat. M. Fr. p. 314, pl. LXXX, f. 35, 36.

Παραλία Ἀμφιάλης. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Synedra Gaillonii Ehr.—Kütz Bac. p. 68, pl. 30, f. 42; V. H. Syn. p. 152, pl. 39, f. 18; Diat. p. 312, pl. 10, f. 424; Perag. Diat. M. Fr. p. 315, pl. LXXX, f. 7.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Synedra Gaillonii var. *elongata* Per; Perag. Diat. M. Fr. p. 315, pl. LXXX, f. 6.
Λιμήν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Synedra Gaillonii var. *macilenta* Grun. V. H. Syn. pl. 40 f. 1; Perag. Diat. M. Fr. p. 315, pl. LXXX, f. 8.
Λιμήν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Synedra affinis Kütz. Bac. p. 68, pl. 15, f. 6 et 11 Sm. B. D. I. p. 73, pl. 12, f. 97; V. H. Syn. pl. 41, f. 13; Diat. p. 314, pl. 10; f. 430; Perag. Diat. M. Fr. p. 318, pl. LXXX, f. 19.

Λιμήν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Fam. XI.—RHAPHONEIDEAE

RHAPHONEIS

Rhaphoneis amphiceros Ehr. Ber. Akad. 1844, p. 87; V. H. Syn. p. 147, pl. 36, f. 22 - 23; Diat. p. 330, pl. 10, f. 394.— *Cocconeis amphiceros* Ehr. Ber. Akad. 1840.— *Doryphora amphiceros* K. Bac. p. 74, pl. 21, f. 2; W. Sm. B. D. I. p. 77, pl. 24, f. 224; Perag. Diat. M. Fr. p. 329, pl. LXXXIII, f. 15 à 19.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Rhaphoneis amphiceros var. *rhombica* Grun. V. H. Syn. pl. 36, f. 20, 21; Diat. p. 330, pl. 10, f. 395; Perag. Diat. M. Fr. p. 329, pl. LXXXIII, f. 10 à 14.
Λιμήν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Rhaphoneis nitida Greg. Diat. of Clyde, p. 492, pl. 9, f. 26 (*Cocconeis*).—
R. liburnica Grun. Wien Verh. 1862, p. 283, pl. 4, f. 7; V. H. Syn. pl. 36, f. 33; Perag. Diat. M. Fr. p. 331; pl. LXXXIII, f. 31 à 33.

“Ορμός Φαλήρου. Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. XII.—PLAGIOPRAGMEEAE

DIMEROGRAMMA

Dimerogramma fulvum Greg. Ralf in Pritch. Inf. p. 790; Grun. Wien. Verh. 1862, p. 376; V. H. Syn. pl. 36, f. 7, Diat. p. 336, pl. 30, f. 849.— *Denticula fulva* Greg. Diat. of. Clyde, p. 496, pl. 10, f. 38; Perag. Diat. M. Fr. p. 334, pl. LXXXII, f. 17, 18.

Λιμήν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὀστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Dimerogramma nanum Greg. Ralf. in Pritch. p. 790, pl. 4, f. 33; V. H.

Syn. pl. 36, f. 11.—*Dim. minor* var. *nana* V. H. Diat. p. 336, pl. 11, f. 393.—*Dim. Gregoryanum* Grun. Wien Verh. 1862, p. 376, pl. LXXXII, f. 15.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

CYMATOSIRA

Cymatosira Lorenziana Grun. Wien. Verh. 1862, p. 378, pl. 7, f. 25; V. H. Syn. pl. 45, f. 42; Perag. Diat. M. Fr. p. 337, pl. LXXXII, f. 24.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Fam. XIII.—LICMOPHOREAE

LICMOPHORA

Licmophora flabellata Ag. Ktz. Bac. p. 123, pl. 12, f. 1-4; V. H. Syn. pl. 46, f. 2, 3; Diat. p. 342, pl. 31, f. 842. *Licm. argetescens* Ag. et Kütz; Perag. Diat. M. Fr. p. 345 pl. LXXXIV, f. 1.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Licmophora Remulus Grun. M. M. J. 1877, p. 193, f. 1; V. H. Syn. pl. 46, f. 4; Perag. Diat. M. Fr. p. 345, pl. LXXXIV, f. 3.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Licmophora communis (Heiberg?) Grun. V. H. Syn. pl. 48, f. 8, pl. 31, f. 837.—*Podosphenia communis* Heiberg. comp. p. 76; Perag. Diat. M. Fr. p. 347, pl. LXXXV, f. 20.

Ορμός Αἴξωνῆς (Βούλλα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Licmophora Lyngbyei K. Bac. p. 121, pl. 9, f. 10, f. 1 (Podosphenia); V. H. Syn. p. 158, pl. 46, f. 1, 47, f. 16, 19; Diat. p. 344, pl. 11, f. 46^o; Perag. Diat. M. Fr. p. 349, pl. LXXXV, f. 9 à 12.

Ορμός Αἴξωνῆς (Βούλλα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Licmophora Lyngbyei var. *elongata* Grun. V. H. Syn. pl. 47, f. 21; Perag. Diat. M. Fr. p. 349, pl. LXXXV, f. 8.

Ορμός Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Licmophora Ehrenbergii K. Bac. p. 121, pl. 9, f. 13; pl. 24, f. 1 (Podosphenia); V. H. Syn. pl. 47, f. 10, 11; Diat. p. 344, pl. 31, f. 853.—Perag. Diat. M. Fr. p. 350 pl. LXXXV, f. 5, 6.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Licmophora Ehrenbergii var. *angustata* Grun.—*Licm. angustata* Grun. V. H. Syn. pl. 46, f. 6, 7; Perag. Diat. M. Fr. p. 350, pl. LXXXV, f. 7.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Licmophora Ehrenbergii var. *ovata* Sm. - V. H. Syn. pl. 47, f. 13; Diat. p. 344. pl. 31, f. 854. — *Podosphenia ovata* Sm. B. D. I., pl. 83, pl. 24, f. 266.

“Ομος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Fam. XIV.—TABELLARIEAE

GRAMMATOPHORA

Grammatophora marina var. *tropica* K. Bac. p. 128, pl. 30, f. 11; Perag. Diat. M. Fr. p. 353, pl. LXXXVII, f. 4, 5.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Grammatophora marina var. *undulata* Ehr. Ber. 1840, p. 161; K. Bac. p. 129, pl. 29, f. 68; V. H. Syn. pl. 53 bis, f. 17; Perag. Diat. M. Fr. p. 354; pl. LXXXVII, f. 24.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Grammatophora oceanica fa *vulgaris* Grun. in V. H. T. n° 355; V. H. Diat. p. 354; Perag. Diat. M. Fr. p. 354, pl. LXXXVII, f. 12.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Grammatophora oceanica fa *communis* Grun. in V. H. T. n° 355; V. H. Diat. p. 354; Perag. Diat. M. Fr. p. 355, pl. LXXXVII, f. 9 - 11.

Λιμὴν Μουντίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Grammatophora oceanica fa *minuscula* Per; Perag. Diat. M. Fr. p. 355, pl. LXXXVII, f. 13.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Grammatophora oceanica var. *macilenta* Sm. V. H. Syn. p. 164, pl. 53 bis, f. 16; Diat. p. 354, pl. 11, f. 480 a. — *Gramm. macilenta* Sm. B. D. II, p. 43, pl. 61, f. 382; Perag. Diat. M. Fr. p. 355, pl. LXXXVII, f. 14 - 17.

“Ομος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Grammatophora oceanica var. *adriatica* Grun. V. H. Syn. pl. 53 bis, f. 9; Perag. Diat. M. Fr. p. 355, pl. LXXXVII, f. 19.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Grammatophora serpentina Ehr. — Ehr. Ber. 1844, p. 203; Sm. B. D. II, p. 43, pl. 61, f. 315; V. H. Syn. pl. 53, f. 1, 2, 3; Diat. p. 355, pl. 11, f. 482 a; Perag. Diat. M. Fr. p. 356, pl. LXXXVIII, f. 1, 2, 3, 5.

Παραλία Ἀμφιάλης (Πέραμα) Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Grammatophora serpentina var. *elongata* Per. Perag. Diat. M. Fr. p. 356,
pl. LXXXVIII, f. 8, 9.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστοάκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Grammatophora longissima Petit Campbell. p. 34, pl. 5, f. 21; V. H. Syn.
pl. 83 bis, f. 1, 2.— Perag. Diat. M. Fr. p. 357, pl. LXXXIII, f. 10.

Λιμὴν Ζέας. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὁλοθυρίων (*Holothuria*).

Grammatophora angulosa var. *mediterranea* Grun. V. H. Syn. pl. 53, f. 5;
Perag. Diat. M. Fr. p. 358, pl. LXXXVIII, f. 18.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

RHABDONEMA

Rhabdonema adriaticum Kütz. Bac. p. 126, pl. 18, f. 7; Sm. B. D. II, p. 35,
pl. 38, f. 305; V. H. Syn. p. 166, pl. 54, f. 11-13; Diat. p. 360, pl. 12, f. 486 α;
A. S. Atl. pl. 217, f. 17 à 29.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

STRIATELLA

Striatella unipunctata Ag. Kütz. Bac. 125, pl. 18, f. 5, pl. 24, f. 3; Sm. B.
D. II, p. 37, pl. 38, f. 307; V. H. Syn. p. 165, pl. 54, f. 9, 10; Diat. p. 363, pl. 12, f.
485 α; Perag. Diat. M. Fr. p. 360, pl. LXXXIX f. 1.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι Κυστοσειρῶν (*Cystoseira*).

Striatella (Tessella) interrupta Ehr. Kütz. Bac. p. 125, pl. 18, f. 4; V. H.
Syn. p. 165. pl. 54, f. 8; Diat. p. 363, pl. 12, f. 484 α.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Fam. XVI.—BIDDULPHIEAE

BIDDULPHIA

Biddulphia pulchella Gray. Sm. B. D. pl. 94, f. 321; 12 V. H. Syn., pl. 97,
f. 1-3; Diat. p. 470, pl. 20, f. 230 A. S. Atl., pl. 118, 120, 121; Perag. Diat. M. Fr.
p. 376, pl. XCIII, f. 1, 2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστοάκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Biddulphia Regina Sm. B. D. II p. 50, pl. 46. f. 323, V. H. Syn. pl. 98, f. 1;
Diat., p. 471, pl. 34, f. 894; A. S. atl. pl. 119, f. 18; Perag. Diat. M. Fr. p. 376, pl.
XCIV, f. 1.

Οφρυς Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Biddulphia Tuomeyi (Bail.) Roper. T. M. S., 1859; Perag. Diat. M. Fr. p. 377, pl. XCIII, f. 3, 4, pl. XCIV, f. 2.

Λιμὴν Ἡρακλέους. Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

TRIGONIUM

Trigonium punctatum Brightw. m. J. 1856, p. 275, pl. 17, f. 18; A. S. atl. pl. 76, f. 19-20 (Triceratium). V. H. Syn. pl. 109, f. 6, 9, 10 (Biddulphia); Perag. Diat. M. Fr. p. 378, pl. CIV, f. 7.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Trigonium sculptum Shadb. T. M. S. II, p. 15, pl. I, f. 4; A. S. atl. pl. 76, f. 9-12; 150, f. 17 (Triceratium); V. H. Syn. p. 208, pl. 109, f. 7, 8; Diat. p. 476, pl. 21, f. 645 (Biddulphia).

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθουρίων (*Holothuria*).

ODONTELLA

Odontella (Biddulphia) aurita (Lyngb.) Ag. Kütz. Bac. p. 137, pl. 29, f. 88; *Denticella aurita et gracilis* Ehr.; *Biddulphia aurita* Bréb., W. Sm. B. D. I. p. 49, pl. 45, f. 319; V. H. Syn. p. 205, pl. 98, f. 4-9; A. S. atl. pl. 120, f. 5-10, 122, f. 1-8, 28, (Odontella); Perag. Diat. M. Fr. pl. 381, pl. XCVIII, f. 3-6.

Λιμὴν Ἡρακλέους. Ἐν τῷ πεπτικῷ σωλῆνι Ὀλοθυρίων (*Holothyria*).

TRICERATIUM

Triceratium (Amphitetras) antediluviana var. *minor*.— Per. Diat. M. Fr. p. 384, pl. CII, f. 6, 7.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλ. Φαλήρου. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Triceratium (Amphitetras) antediluviana var. *tessellata* Shadb. T. M. S. 1854, p. 16, pl. I, f. 11; Perag. Diat. M. Fr. p. 384, pl. CII, f. 5.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Triceratium favus Ehr. Abh. Ber. Ak. 1839, pl. 4, f. 10; Kütz. Bac., p. 139, pl. 18, f. 11; Sm. B. D. I, p. 26, pl. 5, f. 44; A. S. atl., pl. 82, f. 13, 14; V. H. Syn. p. 208, pl. 107, f. 1-4 (Odontella); V. H. Diat., p. 475, pl. 21, f. 643 (Biddulphia).
— *Tric. fimbriatum* Wall, M. J. 1858, p. 247, pl. 2, f. 2, 4-9; A. S. atl. pl. 82, f. 6-7.
— *Tric. megastomum* E. Bright. M. J. 1854, p. 249, pl. 4, f. 7.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατσίνη). Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Triceratium (Lampriscus) orbiculatum Shadb. T. M. S. 1854, p. 14, pl. I, f. 6; Brightw. M. J. 1856, p. 276, pl. 17, f. 20; *Tric. circulare* Grun., V. H. Syn. pl. 108, f. 10; Perag. Diat. M. Fr. p. 388, pl. CVI, f. 2, 3.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατοίνι). Ἐπὶ θαλασσίων φυκῶν.

Triceratium (Lampriscus) Shadboldtianum Grev. T. M. S. 1862, p. 28; V. H. Syn. pl. 108, f. 517; A. S. atl. pl. 80, f. 18, 20; Perag. Diat. M. Fr. p. 389, pl. CVI, f. 1.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν Παλαιοῦ Φαλήρου. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. XVII.—AULISCOIDEAE

AULISCUS

Auliscus coelatus Bail. Smith. Conts, 1853, p. 6, f. 3-4. Grev. T. M. S. 1863, p. 44, pl. 2, f. 7; A. S. atl. pl. 32, f. 14-15; Perag. Diat. M. Fr. p. 400, pl. CVIII, f. 6-7.

Λιμὴν Ἡρακλέους (Κερατοίνι). Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. XVIII.—ASTEROLAMPREAE

ASTEROLAMPRA

Asterolampra Marylandica Ehr. Ber. Ak. 1844, p. 76, f. 10; Brightwell, Q. J. M. S. 1860, p. 94, pl. 5, f. 3; Perag. Diat. M. Fr. p. 404, pl. CX, f. 2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Asterolampra Marylandica var. *major* H. P. Diat. Villefr. p. 82.—*Ast. Marylandica*, var. *Wallich.*, T. M. S., 1860, p. 47, pl. 11, f. 14 (?); Perag. Diat. M. Fr. p. 405, pl. CX, f. 1.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ δστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Asterolampra Grevillei Wallich. T. S. M. 1860, p. 47, pl. II, f. (asteromphalus).—*A. Grevillei* var. *adriatica*, Grun., V. H. Syn. pl. 127, f. 12.—*A. rotula* Grun., T. M. S. 1860, p. 111, pl. 3, f. 5; Perag. Diat. M. Fr. p. 405, pl. CX, f. 3.

Fam. XIX.—HELIOPELTEAE

ACTINOPTYCHUS

Actinoptychus undulatus (Ehr.) Ralfs, in Pritch., p. 839, pl. 5, f. 88; A. S. Atl., pl. I, f. 1-16; V. H. Syn., pl. 22 bis, f. 14, 122, f. 1-3; Diat., p. 496, pl. 22, f. 648; Perag. Diat. M. Fr. p. 409, pl. CXI, f. 1.

Οφιος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Actinoptychus adriaticus Grun.—Wien Verh. 1863, p. 160, pl. 13, f. 20. V. H. Syn., pl. 121, f. 4; Perag. Diat. M. Fr. p. 410, pl. CXI, f. 3.

"Ορμος Φωρῶν (Δραπετσῶνα). Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Fam. XX.—COSCINODISCEAE

ACTINOCYCLUS

Actinocyclus Ehrenberghii Ralfs in Pritch. inf., p. 834; V. H. Syn. p. 215, pl. 123, f. 7; Perag. Diat. M. Fr. p. 414, pl. CXIV, f. 1.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

COSCINODISCUS

Coscinodiscus excentricus Egr. Ber. A. K. 1839, p. 146. Sm. B. D. I, p. 23, pl. 3, f. 38; A. S. Nords. Diat. pl. 3, f. 36-38; Atl. pl. 58, f. 46-49; V. H. Syn. p. 217, pl. 130, f. 4-8; Perag. Diat. M. Fr. p. 426.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Coscinodiscus Oculus Iridis Ehr.— Ber. A. K. 1899; A. S. Atl. pl. 63 f. 6, 7, 9; Perag. Diat. M. Fr. p. 429, pl. CXVIII, f. 2.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Coscinodiscus scintillans Grev? A. S. Nords. Diat. p. 131, pl. 3, f. 33; Perag. Diat. M. Fr. p. 434, pl. CXVII, f. 12.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Coscinodiscus nitidus Greg.— Diat. of Clyde. p. 27, pl. 2, f. 45; A. S. Nords, Diat. p. 94, pl. 3, f. 32; Atl. pl. 58, f. 18; Perag. Diat. M. Fr. p. 434, pl. CXVII, f. 12.

Λιμὴν Ζέας. Ἐπὶ ὁστράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Fam. XXI.—MELOSIREAE

PODOSIRA

Podosira minima Grun.— V. H. Syn. pl. 84, f. 7, 8; Perag. Diat. M. Fr. p. 445, pl. CXX, f. 14.

Ἡτωνεία. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Podosira dubia Grun. V. H. Syn., pl. 84, f. 13-14.— *Melosira dubia* K. Bac. p. 53, pl. 3, f. 6; Perag. Diat. M. Fr. p. 445, pl. CXX, f. 15.

Λιμὴν Μουνιχίας. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

MELOSIRA

Melosira (Paralia) sulcata Ehr.— Ber. 1840, pl. 3, f. 5; V. H. Syn., p. 201,

pl. 91, f. 16.— *Orthosira marina* Sm. B. D. II, p. 59, pl. 53, f. 338; Perag. Diat. M. Fr. p. 448, pl. CXIX, f. 11.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Melosira (Paralia) sulcata f^a *radiata* Grun.— Perag. Diat. M. Fr. p. 448, pl. CXIX, f. 12.

Πόρος Σαλαμῖνος. Ἐν τῷ ἀποπλύματι θαλασσίων φυκῶν.

Melosira (Paralia) sulcata f^a *coronata* (Ehr.) Grun.— *Mel. coronata* Ehr.— V. H. Syn., pl. 91, f. 24; A. S. Atl. pl. 176, f. 20; Perag. Diat. M. Fr. p. 448, pl. CXIX, f. 14.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).

Melosira (Paralia) sulcata var. *biseriata* Grun. V. H. Syn., pl. 91; Perag. Diat. M. Fr. p. 448, pl. CXIX, f. 14.

Κόλπος Ἐλευσῖνος. Ἐπὶ ὁστοράκων τῆς κ. Πίννας (*Pinna nobilis*).